HPLC 测定合日呼 - 5 中的氧化苦参碱

邹继红¹, 王洪斌², 赵春杰³

(1. 赤峰学院医学院, 内蒙古赤峰 024000; 2. 赤峰市传染病防治医院, 内蒙古赤峰 024000; 3. 沈阳药科大学药学院, 辽宁沈阳 110016)

摘要: 目的 采用 HPLC 法测定合日呼 - 5 中氧化苦参碱的含量。方法 采用 Shim-pack CLC-ODS 柱, 流动相为甲醇 - 0.1% 三乙胺 3:8 (10% 磷酸调 pH3), 流速 1.0 mL · min⁻¹, 检测波长 210 nm。结果 氧化苦参碱 4.1 ~ 41 mg · L⁻¹ 与峰面积呈良好的线性关系, 回归方程为: $Y = 36.804X + 0.4436$ ($r = 0.9999$), 平均加样回收率为 99.4%, $RSD = 1.4%$ ($n = 6$)。结论 所用方法简便、快速、准确, 适用于合日呼 - 5 中氧化苦参碱的质量控制。

关键词: RP-HPLC; 合日呼 - 5; 氧化苦参碱; 含量测定

中图分类号: R917

文献标志码: A

文章编号: 1006-0103(2012)01-0104-02

Determination of oxymatrine in Herihu - 5 by RP - HPLC

ZOU Ji-hong¹, WANG Hong-bin², ZHAO Chun-jie³

(1. Medical College of Chifeng University, Chifeng, Neimenggu, 024000 P. R China; 2. Chifeng Infectious Disease Hospital, Chifeng, Neimenggu, 024000 P. R China; 3. School of Pharmacy, Shenyang Pharmaceutical University, Shenyang, Liaoning, 110016 P. R China)

Abstract: **OBJECTIVE** To establish an HPLC method for the determination of oxymatrine in Herihu - 5. **METHODS** Separation was achieved on a Shim-pack CLC-ODS column and detected at 210 nm. The mobile phase was the mixture of methanol and 0.1% triethylamine (3:8, adjust pH3.0 with 10% phosphoric acid) at a flow rate of 1.0 mL · min⁻¹. **RESULTS** The linear range was 4.1 - 41 mg · L⁻¹. The linear equation was $Y = 36.804X + 0.4436$ ($r = 0.9999$). The mean method recovery was 99.4% with RSD of 1.4% ($n = 6$). **CONCLUSION** The method is simple, rapide, accurate. It is suitable for the determination of oxymatrine in Herihu - 5.

Key words: RP-HPLC; Herihu - 5; Oxymatrine; Content determination

CLC number: R917

Document code: A

Article ID: 1006-0103(2012)01-0104-02

合日呼 - 5 是蒙医传统药方, 出自蒙医经典著作《观者之喜》, 《蒙医百科全书》中也有记载^[1]。该方由苦参、栀子、诃子、川楝子和地格达五味药材组成, 具有清热、凉血之功效^[1], 蒙医临床上主要用于关节病和皮肤病。方中主药苦参的含量测定未见文献报道, 为有效控制该制剂的质量, 参照有关文献^[2-6], 采用 RP-HPLC 法测定合日呼 - 5 中的氧化苦参碱。方法操作简单、省时, 结果准确, 精密度、重复性较好, 可用于该制剂的含量测定。

1 实验部分

1.1 仪器与试剂

1200 型高效液相色谱仪 (美国 Agilent); UV765 紫外可见分光光度计 (上海精密科学仪器有限公司)。氧化苦参碱对照品 (中国药品生物制品检定所, 批号: 110780-200506); 甲醇为色谱纯; 磷酸和三乙胺均为分析纯; 水为娃哈哈纯净水; 蒙药合

日呼 - 5 (内蒙古民族大学附属医院蒙药制剂室); 阴性对照药材 (内蒙古赤峰市中蒙医院) 经沈阳药科大学孙启时教授鉴定。

1.2 方法与结果

1.2.1 色谱条件 采用 Shim-pack CLC-ODS 色谱柱 (150 mm × 6.0 mm, 5 μm), 柱温为室温, 流动相为甲醇 - 0.1% 三乙胺 (3:8, 10% 磷酸调 pH3), 流速 1.0 mL · min⁻¹, 检测波长 210 nm, 进样量 20 μL。

1.2.2 溶液的制备 精密称取 2.05 mg 氧化苦参碱对照品, 置 10 mL 量瓶中, 用流动相溶解并定容, 即得 205 mg · L⁻¹ 的氧化苦参碱对照品贮备溶液。精密吸取贮备溶液 3.0 mL, 置 25 mL 量瓶中, 用流动相定容, 即得 24.6 mg · L⁻¹ 的对照品溶液。精密称取 0.05 g 已研细的合日呼 - 5 细粉, 置具塞锥形瓶中, 加入 0.1 mL 氨水润湿, 再加入 10 mL 无水乙醇, 密塞, 超声处理 (250 W, 40 kHz) 30 min, 放冷后

基金项目: 内蒙古自治区高校科研资助项目 (编号: NJ10241)

作者简介: 邹继红 (1971-), 女, 内蒙古赤峰, 硕士, 副教授, 从事药物分析的科学与科研工作。Email: zoujihong188@163.com

过滤,容器与滤器用 20 mL 无水乙醇分 4 次洗涤,合并滤液与洗液,置水浴上蒸干,残渣用流动相溶解,并定容至 10 mL,用 0.45 μm 微孔滤膜过滤,滤液作为供试品溶液。按处方要求制备不含氧化苦参碱药材的样品,同法制成阴性样品溶液,备用。

1.2.3 专属性试验 取氧化苦参碱对照品溶液、供试品溶液和阴性样品溶液,按“1.2.1”项色谱条件分别进样 20 μL ,测定,色谱图见图 1。由图可知:氧化苦参碱的保留时间约 4.3 min,阴性样品对氧化苦参碱的测定无干扰,氧化苦参碱与其他组分可达基线分离。

图1 对照品(A)、阴性样品(B)、供试品(C)的高效液相色谱图

Fig 1 HPLC chromatograms of control solution (A), negative sample solution (B) and sample solution (C)

1.2.4 线性范围的考察 分别精密吸取氧化苦参碱对照品贮备溶液 0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0 mL,置 25 mL 量瓶中,用流动相稀释定容,即得一系列氧化苦参碱对照品溶液。分别精密吸取氧化苦参碱系列对照品溶液 20 μL 进样,测定峰面积。以氧化苦参碱浓度($\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$)为横坐标、峰面积为纵坐标进行线性回归,得回归方程为: $Y = 36.804X + 0.4436$ ($r = 0.9999$)。氧化苦参碱 4.1 ~ 41 $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 与峰面积具有良好的线性关系。

1.2.5 精密度试验 取 24.6 $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 的氧化苦参碱对照品溶液及供试品溶液各 20 μL ,分别进样,重复 6 次,测定峰面积。计算得对照品及样品的 RSD 分别为 0.82%、1.4%,表明仪器精密度良好。

1.2.6 稳定性及重复性试验 精密吸取同一份供试品溶液,分别于室温下放置 0、2、4、6、8 h 时进样,测定峰面积。计算峰面积的 RSD = 1.9%,表明供试品溶液在 8 h 内稳定。精密称取同一批样品,按“1.2.2”项方法制备 6 份供试品溶液,按“1.2.1”项条件测定。计算得样品中氧化苦参碱的平均含量为 4.68 $\text{mg} \cdot \text{g}^{-1}$,RSD = 1.8%,表明方法的重复性良好。

1.2.7 加样回收率试验 分别精密称取 0.05 g 已知氧化苦参碱含量的同一批(4.68 $\text{mg} \cdot \text{g}^{-1}$)样品粉末 6 份,分别精密加入 1.0 mL 120 $\text{mg} \cdot \text{L}^{-1}$ (另行配制)的氧化苦参碱对照品贮备溶液,按“1.2.2”项方法处理后进样 20 μL 测定。计算氧化苦参碱回

收率(表 1)。

表1 加样回收率的试验结果($\text{mg}, n = 6$)

Table 1 Results of recovery test($\text{mg}, n = 6$)

Original	Added	Detected	Recovery/%	$\bar{X}/\%$	RSD/%
0.231	0.120	0.348	97.5	99.4	1.4
0.225	0.120	0.345	100.0		
0.221	0.120	0.342	100.8		
0.222	0.120	0.341	99.2		
0.224	0.120	0.345	100.8		
0.223	0.120	0.341	98.3		

1.2.8 样品的测定 取 3 个批号的样品,按“1.2.2”项方法处理,然后分别精密吸取 20 μL 供试品溶液和氧化苦参碱对照品溶液,进样,测定峰面积,按外标法计算氧化苦参碱的含量,计算 3 批样品的平均含量分别为 4.76、4.68、4.82 $\text{mg} \cdot \text{g}^{-1}$ 。

2 讨论

以紫外可见分光光度计扫描氧化苦参碱对照品溶液,其最大吸收波长为 206 nm,考虑到甲醇在此波长处的吸光度较大,故选取检测波长为 210 nm,可减少溶剂的干扰,基线较稳。尝试采用甲醇-乙腈-乙酸铵缓冲溶液、乙腈-无水乙醇-磷酸溶液、乙腈-磷酸二氢钾-十二烷基硫酸钠-水、磷酸-甲醇、乙腈-水作为流动相^[2-6],但氧化苦参碱的峰形不佳或与其他组分无法分离。当采用文中的条件时,氧化苦参碱的峰形对称,与其他组分分离良好。挥干溶剂后,残渣溶解时曾采用无水乙醇和流动相两种溶剂,结果发现流动相溶解的样品中氧化苦参碱与干扰峰的分度度好,且杂质峰较少,所以采用流动相溶解残渣。分别测定了超声提取 20、30、40 min 的样品,结果提取 30、40 min 的样品测得的结果比较接近,故采用超声 30 min。

参考文献:

- [1] 白清云. 中国医学百科全书·蒙医学[M]. 上海: 上海科技出版社, 1992: 260.
- [2] 黄松, 陈吉航, 陶艳, 等. RP-HPLC 法测定妇科栓剂中氧化苦参碱、苦参碱和小檗碱含量[J]. 药物分析杂志, 2010, 30(1): 110-113.
- [3] 任永红, 冯绍华. HPLC 法测定康妇灵片中苦参碱和氧化苦参碱的含量[J]. 安徽医药, 2009, 13(2): 154-155.
- [4] 刘燕, 曲延伟, 刘园华. 高效液相色谱法测定痔痛安软膏中苦参碱与氧化苦参碱的含量[J]. 食品与药品, 2009, 11(3): 38-40.
- [5] 江海, 吴三桥, 江珊, 等. 苦参和狼牙刺植株中苦参碱与氧化苦参碱的含量测定[J]. 湖北农业科学, 2009, 48(12): 3136-3138.
- [6] 张成颖, 弥宏, 赵宏峰, 等. HPLC 测定前列康胶囊中的苦参碱与氧化苦参碱[J]. 华西药理学杂志, 2010, 25(4): 476-477.

收稿日期: 2011-03-33

论文降重，论文修改，论文代写加微信:18086619247或QQ:516639237

论文免费查重，论文格式一键规范，参考文献规范扫二维码：

[相关推荐：](#)

[HPLC法测定鞣酸苦参碱中3种生物碱的含量](#)

[HPLC测定妇科炎症中苦参碱及氧化苦参碱的含量](#)

[HPLC同时测定云香精中苦参碱和氧化苦参碱含量](#)

[HPLC测定合日呼-5中的氧化苦参碱](#)

[HPLC法测定氧化苦参碱的含量](#)

[HPLC法测定山豆根中苦参碱和氧化苦参碱的含量](#)

[HPLC法测定苦参碱阴道凝胶中的有关物质](#)

[HPLC测定苗格郎洗剂中苦参碱和氧化苦参碱的含量](#)

[HPLC法同时测定氧化槐果碱、槐定碱和苦参碱](#)

[HPLC法测定蒙药四味土木香散中氧化苦参碱的含量](#)