盐酸巴尼地平的含量测定及其相关物质的检查

杨光¹, 李立威², 项光亚^{1*}

(1. 华中科技大学同济医学院药学院, 武汉 430030 2. 武汉百科药物开发有限公司, 武汉 430056)

摘要 目的: 建立高效液相色谱法测定盐酸巴尼地平的含量及其相关物质。方法: 采用 Phenomenex-Gemini C₁₈ (5 μm, 4.6 mm × 250 mm) 色谱柱, 以甲醇-0.005 mol·L⁻¹ KH₂PO₄ (50:50, pH 3.0) 为流动相, 检测波长为 236 nm, 流速为 1.0 mL·min⁻¹, 柱温为室温。结果: 盐酸巴尼地平主要成分与其相关物质峰完全分离, 在 6~14 μg·mL⁻¹ 浓度范围内呈良好线性关系, 平均回收率 99.6%, RSD = 0.5% (n = 5)。结论: 该方法专属性好, 精密度、准确度符合要求, 方法可靠, 可用于盐酸巴尼地平的含量及其相关物质的测定。

关键词: 反相高效液相色谱; 盐酸巴尼地平; 非对映异构体

中图分类号: R917 文献标识码: A 文章编号: 0254-1793(2009)02-0320-03

HPLC determination of barnidipine hydrochloride and its related substances

YANG Guang¹, LILi-wei², XIANG Guang-ya^{1*}

(1. Pharmacy School of Tongji Medical College Huazhong University of Science & Technology, Wuhan 430030, China

2. Wuhan Biocase Pharmaceutical Development Co. Ltd., Wuhan 430056, China)

Abstract Objective To develop an HPLC method for the determination of barnidipine hydrochloride and its related substances. **Methods** The determination was performed on an Phenomenex-Gemini C₁₈ (5 μm, 4.6 mm × 250 mm) column with methanol-0.005 mol·L⁻¹ KH₂PO₄ (50:50, pH 3.0) as the mobile phase. The flow rate was 1.0 mL·min⁻¹, the detection was set at 236 nm and the column temperature was maintained at room temperature. **Results** Barnidipine and its related substance were completely separated. The calibration curve was linear in the range of 6-14 μg·mL⁻¹, the average recovery was 99.6%, RSD = 0.5% (n = 5). **Conclusion** The method is proved to be specific, accurate and reproducible. The proposed HPLC method can be used for the determination of barnidipine hydrochloride and its related substances.

Key words RP-HPLC; barnidipine hydrochloride; diastereomer

巴尼地平 (barnidipine) 是由日本山之内公司研究开发的选择性二氢吡啶类钙拮抗剂^[1], 是该类药物中的第一个单一光学异构体, 于 1992 年在日本上市。由于它的分子结构中有 2 个手性中心, 共有 4 个光学异构体 (4S-3S 型、4R-3S 型、4S-3R 型、4R-3R 型), 其中以 (4S-3S) 型即 I 的活性最高^[2]。经研究发现^[3], I 不仅具有血管选择性高、降压作用强而持久的特点, 而且它对心、肾还有保护作用、不产生反射性心动过速, 且耐受性更好, 不良反应发生率比尼群地平、氨氯地平更低, 因而常用于对老年人高血压患者的治疗, 是临床上治疗轻中度高

血压的一线药物。

目前, 未见国内外有盐酸巴尼地平含量分析的相关文献报道。本文采用高效液相色谱法, 在 236 nm 检测波长下, 测定了盐酸巴尼地平的含量及其相关物质。该法能够在适宜时间内完成分离测定, 重现性、精密度及可靠性良好, 可用于盐酸巴尼地平原料药的质量控制, 并可为其制剂含量分析及稳定性考察提供参考。

1 仪器与试剂

1.1 仪器 日本岛津公司 HPLC 系统: LC-10AD 型高效液相色谱仪, SPD-10A 型紫外检测器,

* 通讯作者 Tel: (027) 83692793 E-mail: youjitt@mails.tjmu.edu.cn

N2000在线色谱工作站。

1.2 试药 盐酸巴尼地平对照品(武汉百科药物开发有限公司提供,含量 99.6%);盐酸巴尼地平非对映体(4R-3S型,自制);盐酸巴尼地平原料药样品(武汉百科药物开发有限公司提供,批号:051101,051102,051103)。甲醇为色谱纯,磷酸二氢钾、磷酸为分析纯,实验用水为重蒸水。

2 方法与结果

2.1 色谱条件 色谱柱: Phenomenex-Gemini C₁₈ (5 μm, 4.6 mm × 250 mm); 流动相: 甲醇 - 0.005 mol·L⁻¹ KH₂PO₄ (50:50 磷酸调 pH 至 3.0); 检测波长为 236 nm; 流速为 1.0 mL·min⁻¹, 柱温为室温。

2.2 溶液的配制

对照品储备液: 取盐酸巴尼地平对照品约 25 mg 精密称定, 置于 50 mL 量瓶中, 加甲醇使其溶解, 并以流动相稀释至刻度, 摇匀, 即得。

对照品溶液: 精密量取盐酸巴尼地平对照品储备液 10 mL 置 100 mL 量瓶中加入流动相稀释至刻度, 摇匀。

供试品溶液: 取盐酸巴尼地平粉末, 研匀, 精密称取 25 mg 置 25 mL 量瓶中, 加甲醇适量使其溶解, 并以流动相稀释至刻度, 摇匀取 5 mL, 置 50 mL 量瓶中, 加流动相稀释至刻度, 摇匀, 即得。

非对映体溶液: 取盐酸巴尼地平非对映体约 10 mg 置于 25 mL 量瓶中, 加甲醇使其溶解, 并以流动相稀释至刻度, 摇匀, 即得。

2.3 检测波长的选择 取盐酸巴尼地平对照品适量, 加甲醇溶解并稀释成 10 μg·mL⁻¹ 的溶液, 在 205~400 nm 波长范围内进行扫描, 结果在 236 nm 波长处有最大吸收。因此, 选择检测波长为 236 nm。

2.4 系统适应性试验 在上述色谱条件下, 分别将对对照品储备液、非对映体溶液以及两者适量的混合溶液稀释至 10 μg·mL⁻¹, 各进样 10 μL, 色谱图见图 1。盐酸巴尼地平主峰的保留时间约为 20.4 min, 其非对映异构体的保留时间约为 25.1 min, 两者的分离度大于 1.5^[4], 盐酸巴尼地平的理论塔板数为 4519。

2.5 线性范围、最低定量限和检测限

精密量取对照品储备液适量, 分别用流动相稀释制得浓度为 6, 8, 10, 12, 14 μg·mL⁻¹ 的系列浓度溶液, 分别取 10 μL 注入液相色谱仪, 记录色谱图。以盐酸巴尼地平峰面积对浓度进行回归处理, 以峰

图 1 盐酸巴尼地平及其非对映体 HPLC 图谱

Fig 1 Chromatogram of bamidipine hydrochloride and its diastereomer
1. 盐酸巴尼地平 (bamidipine hydrochloride) 2. 盐酸巴尼地平非对映体 (diastereomer)

面积 *A* 为纵坐标, 溶液浓度 *C* 为横坐标, 得回归方程为:

$$A = 3.1 \times 10^4 C + 45.7 \quad r = 0.9995$$

结果表明盐酸巴尼地平在 6~14 μg·mL⁻¹ 范围内线性关系良好。

取上述对照品溶液适量, 加流动相稀释成 0.2 μg·mL⁻¹ 的溶液, 依法测定, 以 10 倍噪音 (*S/N* = 10) 计算最小定量限, 结果为 4 ng。

另取上述对照品溶液适量, 以流动相逐级稀释后, 进样测定, 测得最低检测为 1 ng (*S/N* = 3), 即本法可检测出 0.025% 的杂质。

2.6 回收率试验 取盐酸巴尼地平对照品约 25 mg 精密称定, 置于 100 mL 量瓶中, 另精密加入样品 25 mg 加甲醇溶解后再用流动相稀释至刻度, 摇匀。精密量取 20 mL 置 1000 mL 量瓶中, 加流动相稀释至刻度, 摇匀。精密量取 10 μL 及上述对照品溶液 10 μL 分别注入色谱仪中, 记录峰面积, 以外标法计算含量, 平均回收率 (*n* = 5) 为 99.6%, *RSD* = 0.5%。

2.7 精密度与稳定性试验

将对对照品溶液用流动相稀释至 10 μg·mL⁻¹, 精密量取 10 μL, 连续进样 5 次, 记录色谱图, 计算得峰面积 *RSD* (*n* = 5) 为 0.3%。

量取供试品溶液, 用流动相稀释至 10 μg·mL⁻¹ (批号: 051101), 分别于室温放置 0, 2, 4, 8, 16, 24 h 后进样测定, 计算得峰面积 *RSD* 为 1.0% (*n* = 6)。

2.8 重复性试验 取 051101 批号样品分别制备 5 份供试品溶液, 测定样品含量为 99.3%, *RSD* 为 0.7% (*n* = 5)。

2.9 含量测定 精密量取供试品溶液及对照品溶液, 用流动相稀释至线性范围后, 量取 10 μL, 按上述色谱条件进行分析, 按外标法以峰面积计算盐酸

巴尼地平的含量。051101, 051102, 051103 批样品的测定结果分别为 99.3%, 99.5%, 99.1%; RSD 分别为 0.7%, 0.5%, 0.4%。

3 讨论

3.1 本文采用在盐酸巴尼地平样品中加入其非对映体 4R-3S 型进行分析, 以考察色谱分离系统的适应性。由于两者是非对映异构体, 其理化性质有一定的差异。因此, 利用 HPLC 有可能将两者进行分离。本文建立的方法, 能够有效地将两者进行分离, 两者的分离度可达到 1.5 以上, 说明选择的该色谱分离条件比较理想。在这样的分离条件应该不仅可以准确测定含量, 还可以用于测定盐酸巴尼地平的相关物质等。

为进一步考查该方法的专属性, 取盐酸巴尼地平对照品储备液适量, 加 10% 过氧化氢溶液破坏 4 h 量取 10 μ L 按上述色谱条件进行分析, 结果几个降解产物均能分开, 说明该方法分离效果良好(见图 2)。

图 2 盐酸巴比地平加过氧化氢破坏后 HPLC 图

Fig 2 Degradation chromatogram of bamidipine hydrochloride by H_2O_2

1 盐酸巴尼地平 (bamidipine hydrochloride); 2~4. 降解产物 (degradation products)

3.2 保持流动相中磷酸二氢钾浓度和 pH 不变, 改变甲醇的比例, 结果表明甲醇浓度对分离效果的影响较大。减少甲醇的浓度, 所有峰的保留时间延长, 在 45% ~ 55% 范围内, 各峰间的分离度较好, 保留时间合适, 而以 50% 最佳, 在此比例下, 各峰均可达到基线分离。

参考文献

- 1 LUO Yong-qiang(罗永强), ZHANG Wan-jin(张万金). Dihydropyridine calcium channel antagonist- Bamidipine(二氢吡啶类钙拮抗剂-巴尼地平). *Intern Med Health Guidance News*(国际医药卫生导报), 2003, 9(1): 40
- 2 Kazuharu Tanazawa, Hideki Arima, Tadao Kojima, et al. Stereoselectivity of a Potent Calcium Antagonist- 1-Benzyl-3-pyrrolidiny 1-Methyl-2,6-Dimethyl-4-(m-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic Acid. *J Med Chem*, 1986, 29(12): 2504
- 3 Terumasa T, Watanabe T, Higuchi S, et al. Pharmacokinetics of bamidipine hydrochloride, a new dihydropyridine calcium channel blocker in the rat, dog and human. *Xenobiotica*, 1995, 25(11): 1237
- 4 ChP(中国药典). 2005. Vol II (二部): Appendix(附录) VD
- 5 SUN Dian-chun(孙殿春), ZHEN Hui-zhe(郑慧哲). New anti-hypertension drug- bamidipine(新抗高血压药-巴尼地平). *China Pharm Inform* (中国制药信息), 2001, 6(17): 21

(本文于 2007 年 10 月 18 日收到)