- [3] 谢贞建,焦士蓉,李 恺,等. RP-HPLC 法测定不同产地枳实中
的柚皮苷、橙皮苷及新橙皮苷[J]. 西华大学学报:自然科学
版 2009 28(2):65-67. 中柚皮苷、橙皮苷、黄芩苷的含量[J]. 药物分析杂志 2009 ,29
(9):1493-1495.
- [4] 郭丽红,郑国钧,苗爱东,等. 高效液相色谱法测定解表清肺丸
[5] 中国药典[S]. 一部. 2010:229.

芙蓉凝胶质量标准研究

曾祖平, 刘 钊*, 张 虎**, 何 薇, 王 宏, 王永红
(首都医科大学附属北京中医医院北京市中医研究所, 北京 100010)

关键词: 芙蓉凝胶; TLC; 黄芩苷; 盐酸小檗碱; 盐酸巴马汀; HPLC

摘要: 目的: 建立芙蓉凝胶(黄连、黄芩、大黄等)质量标准。方法: 采用薄层色谱法鉴别黄连、关黄柏、黄芩、大黄、泽兰; 采用 HPLC 法同时测定盐酸小檗碱、盐酸巴马汀和黄芩苷的含量。结果: 薄层斑点清晰, 阴性对照无干扰; HPLC 分析条件为色谱柱: Kromasil 100-5C₁₈ (150 mm × 4.6 mm); 流动相: 乙腈-0.05 mol/L 磷酸二氢钾-三乙胺(25:75:0.2); 检测波长: 276 nm(黄芩苷) 265 nm(盐酸巴马汀、盐酸小檗碱); 盐酸小檗碱、盐酸巴马汀和黄芩苷有良好的线性关系, 平均回收率分别为 101.23%、100.49% 和 101.49%。结论: 方法可行, 结果可靠, 可作为本品质量控制方法。

中图分类号: R927.2

文献标识码: A

文章编号: 1001-4528(2010)12-2091-05

Quality standard for Furong Gel

ZENG Zu-ping, LIU Zhao*, ZHANG Hu**, HE Wei, WANG Hong, WANG Yong-hong
(Beijing Institute of TCM, Beijing Hospital of TCM Affiliated to Capital Medical University, Beijing 100010, China)

KEY WORDS: Furong Gel; TLC; berberine hydrochloride; palmatin hydrochloride; baicalin; HPLC

ABSTRACT: **AIM:** To establish the quality standard of Furong Gel (*Rhizoma Coptidis*, *Radix Scutellariae*, *Radix et Rhizoma Rhei*, etc.). **METHODS:** *Rhizoma Coptidis*, *Cortex Phellodendri Amurensis*, *Radix Scutellariae*, *Radix et Rhizoma Rhei*, *Herba Lycopi* were identified by TLC. The contents of berberine hydrochloride, palmatin hydrochloride and baicalin were determined simultaneously by HPLC. **RESULTS:** The TLC spots were clear, and the blank test showed no interference. The condition of HPLC was C₁₈ column, ACN-0.05 mol/L KH₂PO₄ as mobile phase, 276 nm and 265 nm as detection wavelength. The linearities of berberine hydrochloride, palmatin hydrochloride and baicalin were good, and the average recoveries were 101.23%, 100.49% and 101.49%, respectively. **CONCLUSION:** The method is reliable and accurate, and can be applied as the quantity control method of Furong Gel.

芙蓉膏为北京中医医院皮外科常用的传统软膏剂,由黄连、黄芩、大黄等药味组成,具有清热解毒,活血消肿的功效,主治丹毒、蜂窝组织炎、疖、痈初起等^[1]。原制剂为药材粉碎后直接加入凡士林基质中,药材有效成分利用度低,软膏油腻,易污染衣物。

为提高其临床疗效,便于使用,我们将芙蓉膏改进为凝胶剂,对其工艺进行了研究^[2]。本实验建立了芙蓉凝胶的质量标准。

1 材料和仪器

芙蓉凝胶(自制);芙蓉凝胶药材饮片(北京杏

收稿日期:2010-06-22

基金项目:北京市中医药科技项目(JJ 2003-16)

作者简介:曾祖平(1963-),女,副主任药师,从事中药制剂研究及中药成分分析。Tel:(010)52176919 E-mail:zzp600@sohu.com

* 刘 钊,首都医科大学中医药学院 2004 级本科生

** 张 虎,哈尔滨医科大学 2005 级本科生

林药业有限责任公司); 盐酸小檗碱对照品(批号 110713-200208, 含量测定用)、黄芩苷对照品(批号 110715-200514, 含量测定用)、盐酸巴马汀对照品(批号:110732-200907, 按盐酸巴马汀为 86.1% 计, 供含量测定用)、大黄素(批号 756-9707)、大黄素甲醚(批号 758-9301)、大黄酸(批号 0757-200206)、大黄酚(批号 796-9303)、芦荟大黄素(批号 795-9301)、熊果酸(批号 110742-200516)、汉黄芩素(1514-200202)、掌叶大黄对照药材、黄连对照药材、关黄柏对照药材、黄芩对照药材均购自中国药品生物制品检定所; 水为重蒸水; 甲醇、乙腈、磷酸为色谱纯, 硅藻土为化学纯, 其余试剂为分析纯; 滤膜(孔径 0.45 μm, 德国 MEMBRANA 公司)。

1100 系列高效液相色谱仪(美国 Agilent 公司, 包括二元泵、自动进样器、多波长检测器), AJ150L 电子精密天平(上海梅特勒-托利多仪器有限公司), SK7210HP 型 KUDOS 超声波清洗机(上海科导超声仪器有限公司), SNB-2 型数字旋转黏度计(上海地学仪器研究所), JC402PH/Mv 智能式数字显示酸度计(北京创业仪器厂)。

2 方法与结果

2.1 性状 本品为棕黄色稠厚液体。

2.2 鉴别

2.2.1 泽兰的薄层色谱鉴别^{[3]157} 取本品 5 g, 加硅藻土 5 g 分散, 晾干, 加入乙醚 30 mL, 超声 10 min, 滤过; 滤渣备用; 滤液挥去溶剂, 残渣用甲醇 1 mL 溶解, 作为供试品溶液。按处方配比称取除泽兰以外的其它药材, 按芙蓉凝胶制备方法制备凝胶, 并按供试品溶液的制备方法制备泽兰阴性对照液。另取熊果酸对照品, 加甲醇制成每 1 mL 含 0.5 mg 的溶液, 作为对照品溶液。照《中国药典》2005 年版一部附录 VIB 薄层色谱法试验, 吸取供试品溶液和阴性对照溶液各 20 μL、对照品溶液 2 μL, 分别点于同一含 0.3% 羧甲基纤维素钠的硅胶 G 板上, 以环己烷-丙酮-乙酸乙酯(5:2:1)为展开剂, 展开, 取出, 晾干, 喷以 10% 硫酸乙醇溶液, 热风吹至斑点显色清晰。供试品色谱中, 在与对照品色谱相应位置上, 显相同紫红色斑点; 365 nm 下显相同橙黄色荧光斑点, 阴性对照无干扰, 见图 1。

2.2.2 大黄的薄层色谱鉴别^{[3]17} 供试品溶液制备同 2.2.1 项; 同 2.2.1 项中方法制备大黄阴性对照液。另取掌叶大黄对照药材粉末 0.1 g, 加甲醇 20 mL, 浸泡 1 h, 滤过, 取滤液 5 mL, 蒸干, 残渣加水 10 mL 使溶解, 再加盐酸 1 mL, 加热回流 30 min, 立

图 1 泽兰的薄层色谱图

Fig. 1 TLC of *Herba Lycopi*

1. 熊果酸对照品 2-4. 3 批凝胶样品 5. 泽兰阴性对照
1. ursolic acid 2-4. samples 5. blank of *Herba Lycopl*

即冷却, 用乙醚萃取 2 次, 每次 20 mL, 合并乙醚液, 蒸干, 残渣加三氯甲烷 1 mL 使溶解, 作为对照药材溶液。再取芦荟大黄素、大黄酸、大黄酚、大黄素甲醚和大黄素对照品, 加甲醇制成每 1 mL 含 0.1 mg 的溶液; 再吸取上述对照品溶液各 1 mL, 混匀, 作为对照品溶液。照《中国药典》2005 年版一部附录 VIB 薄层色谱法试验, 吸取供试品溶液和阴性对照溶液各 10 μL、对照药材和对照品溶液各 5 μL, 分别点于同一含 0.3% 羧甲基纤维素钠的硅胶 H 板上, 以石油醚(30~60℃)-甲酸乙酯-甲酸(15:5:1)为展开剂, 展开, 取出, 晾干, 置紫外灯(365 nm)下检视。供试品色谱中, 在与对照药材和对照品色谱相应位置上, 显相同 5 个橙黄色荧光斑点; 置氨蒸气熏后, 斑点变为红色, 阴性对照无干扰, 见图 2。

图 2 大黄的薄层色谱图

Fig. 2 TLC of *Radix et Rhizoma Rhei*

1. 掌叶大黄对照药材 2. 5 种对照品混合液
3. 阴性对照 4-6. 3 批供试品
1. medicinal materials of rheum palmatum 2. mixed reference substances
3. blank of *Radix et Rhizoma Rhei* 4-6. samples

2.2.3 黄连、关黄柏的薄层色谱鉴别^[4] 2.2.1 项中乙醚提取后的滤渣挥尽溶剂, 加乙酸乙酯-甲醇(3:1)50 mL, 超声 30 min, 滤过, 滤液蒸干, 残渣用甲醇 1 mL 溶解, 作为供试品溶液。按处方配比称取除黄连、关黄柏药材以外的其它药材, 按芙蓉凝胶制备方法制备凝胶, 并按供试品溶液的制备方法制备阴性对照液。另取黄连对照药材、关黄柏对照药材各 0.1 g, 分别加甲醇 10 mL, 超声处理 20 min, 滤

过,作为对照药材溶液。再取盐酸巴马汀、盐酸小檗碱对照品,分别加甲醇制成每1 mL含0.5 mg的溶液,作为对照品溶液。再取上述两种对照品溶液等比例混合,作为混合对照品溶液。照《中国药典》2005年版一部附录VIB薄层色谱法试验,吸取供试品溶液、阴性对照溶液各5 μ L、对照药材溶液、对照品溶液和混合对照品溶液各1 μ L,分别点于同一含0.3%羧甲基纤维素钠的硅胶G薄层板上,以环己烷-乙酸乙酯-异丙醇-甲醇-水-三乙胺(3:3.5:1:1.5:0.5:1)为展开剂,加入展开箱一侧槽中,另侧槽加入与展开剂等体积的浓氨试液共同预平衡20 min,展开,取出,晾干,置紫外灯(365 nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材和对照品色谱相应位置上,显相同黄色荧光斑点,阴性对照无干扰,见图3。

图3 黄连、关黄柏的薄层色谱图

Fig. 3 TLC of *Rhizoma Coptidis* and *Cortex Phellodendri Amurensis*

1. 盐酸巴马汀
 2. 盐酸小檗碱
 3. 盐酸巴马汀 + 盐酸小檗碱
 4. 黄连药材
 5. 关黄柏药材
 - 6-8. 3批供试品
 9. 阴性对照
1. palmatine hydrochloride 2. berberine hydrochloride 3. palmatine hydrochloride and berberine hydrochloride 4. medicinal materials of *Rhizoma Coptidis* 5. medicinal materials of *Cortex Phellodendri Amurensis* 6-8. samples 9. blanks of *Rhizoma Coptidis* and *Cortex Phellodendri Amurensis*

2.2.4 黄芩的薄层色谱鉴别 供试品溶液制备同2.2.1项。同2.2.1项中方法制备黄芩阴性对照液。另取黄芩对照药材0.1 g,加乙酸乙酯-甲醇(3:1)4 mL,浸泡1 h,超声处理30 min,滤过,蒸干,残渣用甲醇1 mL溶解,作为对照药材溶液。照《中国药典》2005年版一部附录VIB薄层色谱法试验,再取汉黄芩素对照品,分别加甲醇制成每1 mL含1 mg的溶液,作为对照品溶液。吸取供试品溶液和阴性对照溶液各10 μ L、对照药材和对照品溶液各2 μ L,分别点于同一含0.3%羧甲基纤维素钠的硅胶G板上,以甲苯-甲酸乙酯-甲酸(15:5:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以3%三氯化铁乙醇溶液。供试品色谱中,在与对照药材和对照品色谱相应位

置上,有相同的暗绿色斑点,阴性对照无干扰,见图4。

图4 黄芩的薄层色谱图

Fig. 4 TLC of *Radix Scutellariae*

1. 黄芩阴性
2. 黄芩对照药材
- 3-5. 3批凝胶样品
6. 汉黄芩素

1. blank of *Radix Scutellariae* 2. medicinal materials of *Radix Scutellariae* 3-5. samples 6. wogonin

2.3 检查

2.3.1 pH值 取本品1 g,称定,加蒸馏水10 mL使溶解,照《中国药典》2005年版一部附录VII G pH值测定法试验,pH值为5.50~6.50。

2.3.2 黏度 照《中国药典》2005年版二部附录VI G黏度测定法中第二法测定,动力黏度为8 500~12 500 mPa·s。

2.4 含量测定

2.4.1 色谱条件 色谱柱:Kromasil 100-5C₁₈(150 mm×4.6 mm);流动相:乙腈-0.05 mol/L磷酸二氢钾-三乙胺(25:75:0.2);流速:1.0 mL/min;检测波长:276 nm(黄芩苷) 265 nm(盐酸巴马汀、盐酸小檗碱);柱温:室温;理论板数按黄芩苷峰计算不低于2 500,按盐酸巴马汀计算不低于4 000,按盐酸小檗碱计算不低于3 000。

2.4.2 对照品溶液的制备及线性关系 精密称取已干燥(60 $^{\circ}$ C减压干燥4 h)的黄芩苷对照品0.012 6 g,用甲醇定容于10 mL量瓶中,制成浓度为1.26 mg/mL的黄芩苷对照品贮备液;分别精密称取已干燥(100 $^{\circ}$ C干燥5 h)的盐酸巴马汀对照品0.010 0 g、盐酸小檗碱对照品0.013 0 g,用甲醇分别定容于25 mL量瓶中,分别制成浓度为0.344 4 mg/mL的盐酸巴马汀对照品贮备液和0.52 mg/mL的盐酸小檗碱对照品贮备液。精密吸取上述黄芩苷对照品贮备液2 mL、盐酸巴马汀对照品贮备液3 mL和盐酸小檗碱对照品贮备液5 mL于同一10 mL量瓶中,制成黄芩苷(0.252 mg/mL)、盐酸巴马汀

(0.103 3 mg/mL)和盐酸小檗碱(0.26 mg/mL)混合对照品溶液。分别进样0.2、0.5、1、2、4 μL,按上述色谱条件测定,记录黄芩苷(276 nm)和盐酸巴马汀、盐酸小檗碱(265 nm)峰面积,分别以黄芩苷、盐酸巴马汀和盐酸小檗碱峰面积积分值(Y)为纵坐标,以进样质量为横坐标(X),进行线性回归,回归方程分别为黄芩苷: $Y = 3\ 562.3X + 10.646$ ($r = 0.999\ 7$) 盐酸巴马汀: $Y = 4\ 114.3X + 52.091$ ($r = 0.999\ 6$) 盐酸小檗碱: $Y = 4\ 607.6X - 76.822$ ($r = 0.999\ 8$) 表明黄芩苷在0.050 4 ~ 1.008 μg 范围、盐酸巴马汀在0.020 7 ~ 0.413 3 μg 范围、盐酸小檗碱在0.052 ~ 1.04 μg 范围内呈良好的线性关系。色谱图见图5。

图5 黄芩苷、盐酸巴马汀和盐酸小檗碱标准品 HPLC 图谱
Fig. 5 HPLC of berberine hydrochloride, palmatin hydrochloride and baicalin

1. 黄芩苷 2. 盐酸巴马汀 3. 盐酸小檗碱
1. baicalin 2. palmatin hydrochloride 3. berberine hydrochloride

2.4.3 供试品溶液制备 取芙蓉凝胶约2 g,精密称定,置100 mL具塞锥形瓶中,精密称取等量硅藻土于同一锥形瓶中,将二者混合分散均匀;取混合物约0.4 g,精密称定,置50 mL具塞锥形瓶中,精密加入流动相10 mL,称定重量,超声处理40 min,取出,放冷,再称定重量,用流动相补足减失的重量,摇匀,用微孔滤膜(0.45 μm)过滤,取续滤液作为供试品溶液。

2.4.4 方法学考察

2.4.4.1 稳定性试验:取凝胶的同一供试品溶液,每隔1 h左右进样测定1次,连续测定6个小时,结果黄芩苷 RSD = 1.09%, 盐酸巴马汀 RSD = 1.35%, 盐酸小檗碱 RSD = 1.40%, 表明6 h内黄芩苷、盐酸巴马汀和盐酸小檗碱基本稳定。

2.4.4.2 精密度试验:同一供试品溶液,连续进样5次,记录黄芩苷、盐酸巴马汀和盐酸小檗碱的峰面积,计算黄芩苷、盐酸巴马汀和盐酸小檗碱峰面积 RSD 分别为 0.53%、0.42% 和 0.44% ($n = 5$),表明仪器精密度符合要求。

2.4.4.3 专属性试验:按处方比例分别制备不含黄连、黄柏的凝胶和不含黄芩的凝胶,照2.4.3项方法

制备黄连、黄柏和黄芩的阴性对照溶液,测定,结果显示在与黄芩苷、盐酸巴马汀和盐酸小檗碱保留时间相应的位置上未见相关吸收峰,说明本品中其他成分对黄芩苷、盐酸巴马汀和盐酸小檗碱的测定无干扰。色谱图见图6、7。

图6 黄芩阴性 HPLC 图谱

Fig. 6 HPLC of blank of *Radix Scutellariae*
2. 盐酸巴马汀 3. 盐酸小檗碱
2. palmatin hydrochloride 3. berberine hydrochloride

图7 黄连、关黄柏阴性 HPLC 图谱

Fig. 7 HPLC of blanks of *Rhizoma Coptidis* and *Cortex Phellodendri Amurensis*
1. 黄芩苷 1. baicalin

2.4.4.4 重复性试验:取同一批芙蓉凝胶,共6份,按2.4.3项方法制备供试品溶液,按2.4.1项色谱条件进行测定。结果芙蓉凝胶中黄芩苷含量 RSD = 1.14% ($n = 6$), 盐酸巴马汀含量 RSD = 1.37% ($n = 6$), 盐酸小檗碱含量 RSD = 1.57% ($n = 6$),表明方法重复性良好。色谱图见图8。

图8 芙蓉凝胶样品 HPLC 图谱

Fig. 8 HPLC of sample of *Furong Gel*
1. 黄芩苷 2. 盐酸巴马汀 3. 盐酸小檗碱
1. baicalin 2. palmatin hydrochloride 3. berberine hydrochloride

2.4.4.5 回收率试验:精密吸取黄芩苷对照品贮备液4 mL、盐酸巴马汀对照品贮备液4 mL和盐酸小檗碱对照品贮备液6 mL于同一25 mL量瓶中,甲醇定容至刻度,得黄芩苷(0.201 6 mg/mL)、盐酸巴马汀(0.055 1 mg/mL)和盐酸小檗碱(0.124 8 mg/

mL)混合对照品溶液。取芙蓉凝胶约2g,精密称定,置100 mL具塞锥形瓶中,精密称取等量硅藻土于同一锥形瓶中,将二者混合分散均匀;取混合物约0.2g,精密称定,置50 mL具塞锥形瓶中,精密加入流动相9.5 mL、混合对照品溶液0.5 mL,其余操作同2.4.3项供试品溶液的制备,按2.4.1项色谱条件进行测定。分别计算回收率,结果平均回收率黄芩苷为101.49%,RSD为1.18%(n=6),盐酸巴马汀为100.49%,RSD为0.87%(n=6),盐酸小檗碱为101.23%,RSD为1.42%(n=6)。结果见表1。

表1 回收率试验结果
Tab. 1 Results of recovery test

成分	样品中含 量/mg	加入量 /mg	测得量 /mg	回收率 /%	平均回收 率/%	RSD /%
黄芩苷	0.105 8	0.100 8	0.208	101.00	101.49	1.18
	0.105 6	0.100 8	0.209	102.30		
	0.105 8	0.100 8	0.210	102.97		
	0.106 0	0.100 8	0.209	102.26		
	0.105 8	0.100 8	0.213	100.46		
	0.105 7	0.100 8	0.212	99.93		
盐酸巴马汀	0.027 1	0.027 6	0.054 5	99.28	100.49	0.87
	0.027 0	0.027 6	0.054 9	101.09		
	0.027 1	0.027 6	0.054 6	99.64		
	0.027 1	0.027 6	0.055 0	101.09		
	0.027 1	0.027 6	0.055 1	101.45		
盐酸小檗碱	0.027 0	0.027 6	0.054 7	100.36	101.23	1.42
	0.105 8	0.062 4	0.128 6	100.41		
	0.105 6	0.062 4	0.128 8	100.98		
	0.105 8	0.062 4	0.128 4	100.14		
	0.106 0	0.062 4	0.128 3	99.84		
0.105 8	0.062 4	0.133 0	103.25			
0.105 7	0.062 4	0.132 6	102.77			

2.4.5 样品测定 取3批样品,按供试品溶液制备方法制成供试液,精密吸取对照品溶液0.5 μL,供试品溶液10 μL,注入液相色谱仪,按上述色谱条件测定,计算黄芩苷、盐酸巴马汀和盐酸小檗碱含量。结果见表2。

表2 芙蓉凝胶中黄芩苷、盐酸巴马汀和盐酸小檗碱含量测定结果

Tab. 2 Contents of berberine hydrochloride, palmatin hydrochloride and baicalin in Furong Gel

编号	平均含量/%			RSD/%			测定 次数
	黄芩苷	盐酸巴 马汀	盐酸小 檗碱	黄芩苷	盐酸巴 马汀	盐酸小 檗碱	
1	0.132	0.027	0.072	1.14	1.37	1.57	6
2	0.108	0.028	0.074	1.67	1.42	1.10	5
3	0.106	0.024	0.066	0.79	0.60	0.89	5

3 讨论

3.1 曾经针对芙蓉叶中的芦丁等黄酮类成分进行了薄层层析鉴别,但阴性对照有干扰,高效液相色谱也显示阴性对照液中含有芦丁,与泽兰中含有芦丁成分的文献记载相符,故放弃。研究泽兰薄层层析时以熊果酸和齐墩果酸作为阳性对照,尝试了多种供试液制备方法和展开剂种类,目前的条件干扰小、斑点清晰,但仍不能分离熊果酸和齐墩果酸,原因是二者为同分异构体,化学性质极其相近。鉴别黄芩时,尝试了多种吸附剂和展开剂,制剂中的基质和其它成分总有干扰;现针对黄酮苷元成分进行鉴别,采用现行展开剂,可鉴别多种成分,斑点较为清晰。

3.2 含量测定时,分别对提取溶剂种类及用量、提取方法及时间进行了单因素考察,优选出的条件对芙蓉凝胶中黄芩苷和盐酸小檗碱的提取率高;HPLC分析时尝试过多种流动相,目前采用的流动相分离度、对称性等符合要求,可同时测定芙蓉凝胶中黄芩苷、盐酸巴马汀和盐酸小檗碱的含量。

参考文献:

- [1] 张志礼. 中西医结合皮肤性病学[M]. 北京:人民卫生出版社,2000:526.
- [2] 曾祖平,乔文越,刘然,等. 芙蓉凝胶的研制[J]. 中国医院药学杂志,2009,29(19):15-18.
- [3] 中国药典[S]. 一部. 2005.
- [4] 药典委员会. 中华人民共和国药典中药薄层色谱彩色图集[M]. 广州:广东科技出版社,1993:70-71.