贮存期浓香型白酒微观形态变化探讨

吴士业, 冯治平

(四川理工学院生物工程系, 四川 自贡 643000)

摘要: 新蒸馏出来的白酒在贮存期内, 酒体的微量成分会发生变化, 酒的微观形态也会发生变化。AFM图显示, 经一定贮存期的酒体微观形态近似球状, 且分布均匀。

关键词: 白酒; 扫描探针显微镜; 微观形态

中图分类号: TS262.3; TS261.4; O65 文献标识码: B 文章编号: 1001-9286(2007)11-0032-02

Study on the Change of Microcosmic Shape of Luzhou-flavor Liquor in Storage Period

WU Shi-ye and FENG Zhi-ping

(Bioengineering Department of Sichuan Technical Institute, Zigong, Sichuan 643000, China)

Abstract: The microconstituents of liquor body changed and then the microcosmic shape of liquor would change consequently in storage period for newly-distilled liquor. AFM spectrum indicated that after certain storage period, liquor presented globular shape and the distribution was even. (Tran. by YUE Yang)

Key words: liquor; scanning probe microscope; microcosmic shape

新蒸馏出来的白酒, 辛辣、冲、刺激性强, 口感糙而不醇和。经一段时期贮存后, 其香、味才会变得有醇厚感, 柔顺, 余香时间长。这是由于在贮存过程中, 白酒发生了一系列的物理和化学变化, 这些变化引起了酒的口感变化。根据对浓香型白酒不同贮存期酒的分析表明, 酒中所含各种金属离子含量在变化, 所含醇类、羰基化合物、有机酸、酯类等呈香呈味的成分含量也在变化。笔者认为白酒在不同贮存期的口感变化, 除了与呈香呈味物质的含量变化有关外, 还应该同白酒中的呈香呈味物质在乙醇-水体系中形成的微观形态变化有关。

本文采用扫描探针显微镜, 运用 AFM 功能, 对浓香型白酒代表泸州老窖在不同贮存期的基酒进行取样测定, 研究在不同贮存期浓香型白酒的 AFM 图变化情况。

1 材料与方法

1.1 仪器与酒样

SPA-400 扫描探针显微镜, 日本精工仪器公司, 采用 AFM 功能。酒样由泸州老窖酿酒公司提供。

1.2 实验方法

取样品基酒 20 μL 滴到新解离的云母基片上, 用滤纸吸去多余液体, 在无尘台上使其自然风干。

Tapping 成像模式: 采用高频振动探针扫描样品, 探针与样品作瞬间接触, 并作扫描, 扫描速率为 1.0 ~ 2.0 Hz。实验温度 25 $^{\circ}\text{C}$, 湿度 50% ~ 60%。

2 结果与分析

2.1 不同贮存期泸州老窖酒的微观形态

采用探针扫描不同贮存期的泸州老窖基酒, 其微观形态见图 1。

从图 1 不同贮存期的 AFM 扫描图中可以看到, 经半年的自然贮存(图 1(a))颗粒平均高度为 3.3 nm, 平均直径宽度为 64.7 nm, 颗粒分布匀称。而从图 1(b)中可以看到经 1 年贮存期后, 图中有许多大小、高度不一的颗粒, 这些颗粒似乎是笼状颗粒。这些长度不同的笼状颗粒, 显示出其是由几个图 1(a)中小颗粒的聚集。图 1(b)中小颗粒的三维尺寸与图 1(a)中颗粒尺寸相近, 而大颗粒的高度为 10 nm, 宽度为 195 nm。图 1(c)是 A 酒样贮存 3 年后 AFM 的二维图, 可以清晰地看到图中的球状结构, 这些微观图形规则, 大小较均匀。颗粒最大表观高度约为 19 nm, 表观宽度为 872 nm, 其颗粒形状近似于球体。

2.2 优质半成品酒的 AFM 扫描图

收稿日期: 2007-08-02

作者简介: 吴士业(1946-)男, 浙江宁波人, 教授, 近期主要研究方向: 发酵条件的优化调控。

图1 不同贮存期的泸州老窖A等级AFM扫描图

优质半成品酒的AFM扫描结果见图2。

从图2中可看出, 优质半成品白酒, 在适合的贮存期后, 其酒体微观颗粒近似于球状, 大小分布错落有致。酒中呈香呈味的痕量和微量物质形成了特定微观形态。

3 讨论

从图1、图2中可以看到, 经发酵蒸馏得到的新酒, 必须经过一定时间的贮存。经过贮存的白酒, 不仅所含的呈香呈味成分发生了变化, 它们在乙醇-水体系中形成的微观形态也在发生变化。这是因为一些呈香呈味成

注:(a):区域1;(b):区域2。

图2 优质白酒半成品酒样AFM图样

分往往是一端具有与水分子形成氢键的基团, 而另一端则往往是疏水基团。在白酒中形成笼状物, 能形成氢键一端朝向乙醇-水, 而疏水一端朝笼状物内部。一些疏水性化合物则存在于笼状物内部, 形成微观形态。在贮存过程中, 小笼状物逐渐合并, 形成大的分子聚集体——胶团, 这就是我们在AFM图中所看到的球形微观形态。白酒的口感应该与呈香呈味物质的种类和数量有关, 也应该与它们在白酒中形成的微观形态有关。

至于不同品质的白酒其微观形态变化与贮存期的关系, 还需深入探讨。

参考文献:

- [1] 白春礼.扫描隧道显微技术及其应用[M].上海:上海科技出版社, 1992.
- [2] 庄名扬.中国白酒的溶胶性及其原理与方法[J].酿酒科技, 2002, (2): 27-30.
- [3] [美]Qwen R.Fennema著, 王璋, 等译.食品化学[M],北京:中国轻工业出版社, 2003.

(上接第31页)

3 结论

3.1 采用6%海藻酸钠6%明胶为9.0 1.0、氯化钙浓度为0.05 mol/L进行酿酒酵母的固定化, 可以获得具有较好机械强度和通透性及细胞渗漏少的固定化颗粒。

3.2 固定化酵母连续发酵17批次的过程中性能稳定, 在低温条件下贮藏6周固定化酵母活性保持完好。

3.3 要将固定化微生物较之游离微生物的优势充分发挥, 必须将固定化微生物作为一种可应用于实际的商业产品进行开发。而要将固定化微生物商业化, 如何延长固定化微生物颗粒的贮藏期, 是需要解决的重点。

参考文献:

- [1] Y. Kourkoutas, A. Bekatorou, I. M. Banat et.al. Immobilization

technologies and support materials suitable in alcohol beverages production: a review[J] Food Microbiology, 2004, (21): 377-397.

- [2] Ilkka Virkajrvi, Matti Linko Immobilization: A revolution in traditional brewing[J].Naturwissenschaften, 1999, (86): 112-122.
- [3] 杜双奎, 张茵, 于修焯, 等.酿酒酵母细胞固定化研究[J].西北农业学报, 2006, 15(3): 208-211.
- [4] 程丽娟, 薛泉宏.微生物学实验技术[M].西安:世界图书出版公司, 2000.298-299.
- [5] 白雪莲.苹果酒酵母固定化技术[D].杨凌:西北农林科技大学, 2006.
- [6] 刘树文, 李华.改善固定化微生物细胞粒子机械强度的研究[J].微生物学杂志, 2005, 25(4): 32-34.