苏丹红 I 在乙醇溶液中的紫外-可见光谱^①

曹稳根^② 翟科峰 周芳

(宿州学院化学与生命科学学院 安徽省宿州市汴河中路 71 号 234000)

摘要 研究了苏丹红 I 在极性溶剂乙醇中的紫外-可见光谱, 同时考察了水、酸碱度、温度和时间等不同实验条件对苏丹红 I-乙醇溶液紫外-可见光谱的影响。结果表明, 苏丹红 I 在乙醇溶液中形成的紫外-可见光谱特征吸收峰主要与其偶氮-醌踪异构体和分子型体有关; 在乙醇-水溶液中, 苏丹红 I 的可见区特征吸收峰逐渐红移, 最大红移达 11nm, 最大增幅为 30.6%, 导致其可见区特征吸收峰红移的原因是由于分子内氢键被破坏, 扩大了 π 键离域的范围; 在酸性/碱性-乙醇溶液中, 紫外-可见光谱特征吸收峰的变化与其分子型体和离子型体相互转变相关; 温度(在 10—40℃ 范围内) 和时间对其紫外-可见光谱特征吸收峰基本无影响, 这与苏丹红 I 顺式结构有关。

关键词 苏丹红 I; 乙醇; 乙醇-水; 酸; 碱; 紫外-可见光谱

中图分类号: O657.32 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-8138(2011)03-026-05

1 引言

苏丹红为亲脂性偶氮化合物, 主要包括 I、II、III 和 IV 4 种, 其中 II、III 和 IV 号均为 I 号的化学衍生物。苏丹红 I (Sudan I, SD I) 是一种人工合成的工业染料, 其化学名为 1-苯基偶氮-2-萘酚, 难溶于水, 易溶于有机溶剂, 被广泛用于家具漆、鞋油、地板蜡、汽车蜡、油脂等的增色和礼花、焰火及溶剂的着色^[1]。由于价格低廉, 添加在食品中着色效果极好, 因而一些不法商贩在食品中使用。SD I 具有潜在致癌作用, 国际癌症研究机构 (IARC) 已将苏丹红 I 归为第三类可致癌物质, 世界各国都禁止将其用于食品添加剂^[2,3]。

物质的结构与型体和物质的光谱学性质存在着密切的关系, 结构与型体不同, 会产生不同的特征吸收光谱。不同溶剂或有机溶液也对溶质的光谱行为造成一定的影响, 然而该领域的研究程度相对较低^[4]。苏丹红系列染料在非极性溶剂环己烷、石油醚和极性溶剂甲醇、乙腈中的紫外-可见光谱研究已有报道^[4,5], 但 SD I 在乙醇溶剂中的紫外-可见光谱未见报道。本文研究了 SD I 在乙醇溶液中的紫外-可见光谱, 考察了水、酸碱度、温度以及时间对 SD I-乙醇溶液紫外-可见光谱的影响, 对 SD I 特征吸收光谱与其分子存在结构和型体之间的关系进行了探讨。

2 实验部分

2.1 仪器和试剂

U-3310 分光光度计 (日本 Hitachi 公司); pH S-3C 精密 pH 计 (上海雷磁仪器厂); FA 2004 N

① 安徽省教育厅自然科学基金项目 (KJ2009B277Z); 宿州学院生物化学与分子生物学重点学科项目 (szxyzdxk 200901)

② 联系人, 电话: (0557) 2871067; 手机: (0) 13955726605; E-mail: caowgsz@163.com

作者简介: 曹稳根 (1964—), 男, 安徽省东至县人, 教授, 硕士, 主要从事生化分析研究工作。

收稿日期: 2010-08-11; 接受日期: 2010-08-26

电子天平(上海精密科学仪器有限公司); 21QX-P1518A 分析实验室专用纯水机(北京群先科技发展有限公司)。

准确称取 0.0422g 苏丹红 I (SD I, 国药集团化学试剂有限公司), 用无水乙醇定容至 500mL 容量瓶中, 配制成 $3.4 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 贮备液。HCl-乙醇操作液浓度为 $10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; NaOH-乙醇操作液浓度为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; HCl、NaOH、无水乙醇均为分析纯。实验用水为超纯水。

2.2 实验方法

在一系列 10mL 具塞比色管内依次加入 SD I 操作液和无水乙醇或超纯水或 HCl-乙醇操作液或 NaOH-乙醇操作液, 用无水乙醇定容, 摇匀。室温放置 10min 后, 以无水乙醇为参比扫描 190—850nm 间的紫外-可见吸收光谱或在给定波长下测定吸光度。

3 结果与讨论

3.1 不同浓度 SD I 在乙醇中的紫外-可见光谱

不同浓度 SD I 在乙醇溶液中的紫外-可见光谱见图 1。由图 1 可见, 在乙醇溶液中, SD I 在紫外区出现了 200、228nm 和 308nm 3 个吸收峰, 紫外区特征吸收峰 λ_{max} 为 228nm, 可见区出现了 423nm 和 477nm 两个吸收峰, 可见区特征吸收峰 λ_{max} 为 477nm, 且紫外-可见特征吸收峰的强度随 SD I 浓度的增加而不断增强。

SD I 分子结构中由于偶氮键结构和邻位羟基萘酚偶氮结构的存在, 使其分子易发生顺反异构(见图 2)和偶氮-醌腭互变异构(见图 3)^[6,7]。SD I 分子顺反异构和偶氮-醌腭互变异构现象的发生, 使其分子所处的共轭平面性发生改变, 因而产生了特征性紫外-可见光谱吸收峰。在 SD I 结构中, 通过偶氮键而形成共轭体系的吸收峰在可见区, 酚羟基、苯环、萘环结构的吸收峰在紫外区^[4]。SD I 属萘系邻羟基偶氮染料, 在偶氮-醌腭异构体中, 由于分子内氢键较强, 其主要以醌腭异构体存在^[8]。因此, 在乙醇溶液中, SD I 醌腭异构体的酚羟基产生 $n \rightarrow \sigma^*$ 跃迁而形成 200nm 吸收峰, 苯环结构和萘环结构分别在 228nm 和 308nm 处产生了紫外吸收峰。偶氮共轭体系在 423nm 和 477nm 处产生了可见吸收峰。

图 1 不同浓度苏丹红 I 在乙醇溶液中的紫外-可见光谱

曲线 a—f 表示苏丹红 I ($\times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 的浓度依次为: 0.34, 0.68, 1.02, 1.36, 1.70, 2.04。

图 2 苏丹红 I 顺式-反式异构体的互变

图 3 苏丹红 I 偶氮-醌腭异构体的互变

3.2 不同含水量对 SD I-乙醇溶液紫外-可见光谱影响

在实验条件下, 测得不同含水量对 SD I-乙醇溶液紫外-可见光谱的影响如图 4。从图 4 可以看出, 随着含水量由 10% 增大到 70%, SD I 在紫外区的 200nm 吸收峰显著下降并消失, 特征吸收峰 λ_{max} 228nm 吸光度也随着含水量的增加逐渐下降, 308nm 吸光度基本不变; 可见区 423nm 吸光度

也随着含水量的增加也逐渐下降,特征吸收峰 $\lambda_{\max}$ 477nm 逐渐红移,红移最大值可达 11nm,吸光度逐渐增大,最大增幅为 30.6% (见表 1)。实验结果表明,当含水量继续增大超过 70% 时,SD I 由于疏水基较大逐渐从乙醇-水溶液中沉淀析出,吸光度明显降低。这与张金平等^[5]研究的 SD I 在乙腈-水溶液的现象相一致。

SD I 在乙醇-水溶液中,乙醇与水形成分子间氢键。在实现 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁时,破坏了 SD I 分子内的氢键,扩大了 π 键的离域范围,从而使 $\lambda_{\max}$ 477nm 吸收峰逐渐红移且强度增大^[5]。SD I 吸收的光能一部分用以 $\pi \rightarrow \pi^*$ 跃迁,另一部分用于破坏分子内氢键。氢键被破坏,酚羟基产生的 $n \rightarrow \sigma^*$ 跃迁逐渐消失。因此,随着含水量的增大,200nm 吸收峰显著下降并消失,特征吸收峰 $\lambda_{\max}$ 228nm 吸光度也随之逐渐降低。

表 1 SD 在乙醇-水体系中可见区的最大吸收波长

含水量 (%)	0	10	20	30	40	50	60	70
$\lambda_{\max}$ (nm)	477	481	484	485	485	486	487	488
<i>A</i>	0.829	0.914	0.969	0.985	1.008	1.036	1.075	1.083

3.3 不同酸碱度对 SD 乙醇溶液紫外-可见光谱的影响

图 5 为不同浓度 HCl 对苏丹红 I 乙醇溶液紫外-可见光谱的影响。由图 5 可见,紫外区特征吸收峰 $\lambda_{\max}$ 228nm 和可见区特征吸收峰 $\lambda_{\max}$ 477nm 的吸光度值基本不变,说明酸度对体系基本无影响。这是因为苏丹红 I 分子在乙醇溶液中主要以醌腭异构体存在,分子内氢键较强,分子较稳定。因此,酸度对其紫外-可见光谱特征吸收峰影响不大。

图 5 不同浓度 HCl 对苏丹红 I 乙醇溶液紫外-可见光谱的影响

SD I 浓度: $1.70 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; a— $\lambda_{\max}$ 228nm;
b— $\lambda_{\max}$ 477nm。

图 4 不同含水量对苏丹红 I 乙醇溶液紫外-可见光谱的影响

曲线 a—h 表示 SD I 浓度: $1.70 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; 含水量 (%) 依次为: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70。

图 6 不同浓度 NaOH 对苏丹红 I 乙醇溶液紫外-可见光谱的影响

曲线 a—f 表示 SD I 浓度: $1.70 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, NaOH ($\times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 浓度依次为: 0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.0。

实验结果表明, 不同浓度 NaOH 对体系紫外区特征吸收峰 $\lambda_{\max}$ 228nm 的吸光度也基本无影响, 主要影响其可见区特征吸收峰 $\lambda_{\max}$ 477nm (图 6)。从图 6 可以看出, 随着体系 NaOH 浓度的逐渐增大, SD I 在 $\lambda_{\max}$ 477nm 处的特征吸收峰逐渐减弱并消失。同时在 $\lambda_{\max}$ 447nm 处出现了新的特征吸收峰并逐渐增强, 且在 $\lambda_{457\text{nm}}$ 处出现了等吸光点。SD I 分子结构中含有酚羟基, 酚羟基的存在使分子表现出易电离出 H^+ , 因此 SD I 所处体系的酸碱性不同直接影响分子的存在型体, 导致分子的光谱性质发生改变^[9]。用 MOH 表示 SD I 的分子式, 在酸碱体系中发生了如下的电离平衡:

由上式可以看出, 当体系酸性增强时, 平衡向左移动, SD I 分子型体数量增多; 碱性增强时, 平衡向右移动, SD I 离子型体数量增多。因此, SD I 在酸碱体系中存在着明显的分子型体与离子型体相互转变。在乙醇和酸性乙醇体系中, SD I 主要以分子型体存在; 在碱性乙醇体系中, 随着体系的碱性逐渐增强, 体系中分子型体数量逐渐减少, 而离子型体数量逐渐增多。所以, 随着 $\lambda_{\max}$ 477nm 处的特征吸收峰逐渐减弱并消失, 并在 $\lambda_{\max}$ 447nm 处产生了新的特征吸收峰且在 $\lambda_{457\text{nm}}$ 处出现了等吸光点。

3.4 不同温度对 SD I-乙醇溶液紫外-可见光谱的影响

图 7 为不同温度对苏丹红 I-乙醇溶液紫外-可见光谱的影响。由图 7 可见, 在 10—40℃ 范围内, $\lambda_{\max}$ 228nm 紫外特征吸收峰强度保持稳定, 超过 40℃ 时随温度的升高而吸光度逐渐减小; 而 $\lambda_{\max}$ 477nm 可见特征吸收峰强度在 10—70℃ 范围内基本不受影响。这是因为在常温下苏丹红 I 处在顺式结构, 分子内能较高, 分子比较稳定。随着温度继续升高, 苏丹红 I 分子由顺式向反式转变, 导致 $\lambda_{\max}$ 228nm 紫外特征吸收峰强度逐渐降低。

图 7 不同温度对苏丹红 I-乙醇溶液的紫外-可见光谱的影响

SD I 浓度: $1.70 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; a— $\lambda_{\max}$ 228nm;
b— $\lambda_{\max}$ 477nm。

图 8 不同时间对苏丹红 I-乙醇溶液的紫外-可见光谱的影响

SD I 浓度: $1.70 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$; a— $\lambda_{\max}$ 228nm;
b— $\lambda_{\max}$ 477nm。

3.5 不同时间对 SD I-乙醇溶液紫外-可见光谱的影响

图 8 为不同时间对苏丹红 I-乙醇溶液紫外-可见光谱的影响。由图 8 可见, 紫外区特征吸收峰 $\lambda_{\max}$ 228nm 和可见区特征吸收峰 $\lambda_{\max}$ 477nm 的吸光度值随时间的变化而基本不变, 表明 SD I 在乙醇溶液中很稳定。这是由于苏丹红 I 分子主要以酮腭异构体存在, 分子内氢键较强的缘故。

4 结论

SD I 在乙醇溶液中形成的紫外-可见光谱特征吸收峰主要与分子的醌腙异构体和分子型体有关。不同实验条件对 SD I-乙醇溶液紫外-可见光谱特征吸收峰影响不同。随着含水量增大,可见区特征吸收峰逐渐红移,最大红移值可达 11nm,吸收峰强度亦逐渐增大,最大增幅为 30.6%,导致其可见区特征吸收峰红移的原因是由于分子内氢键被破坏,扩大了 π 键离域的范围;酸度对其紫外-可见光谱特征吸收峰影响不大;随着碱性不断增强,在可见 $\lambda_{\max}$ 477nm 处的特征吸收峰逐渐减弱并消失且在 $\lambda_{\max}$ 447nm 处出现了新的吸收峰,这与 SD I 在酸碱体系存在着分子型体与离子型体相互转变相关;时间和温度(在 10—40℃ 范围内)对其紫外-可见光谱特征吸收峰影响也基本无影响,说明 SD I 处在顺式结构,分子比较稳定。

参考文献

- [1] 庞楠楠,白玉,刘虎威. “苏丹红风波”引起的思考[J]. 大学化学, 2009, **24**(1): 24—27.
- [2] 周能,梁逸曾,程前等. 苏丹 I 与牛血清白蛋白的相互作用特征[J]. 化学通报, 2007, **70**(5): 376—379.
- [3] 杨胜园,吕昌银,陆一松等. 苏丹红 I-甲醇体系的共振光散射光谱研究及其应用[J]. 分析科学学报, 2007, **23**(6): 739—740.
- [4] 杨胜科,张金平,徐永花等. 苏丹 III 在不同溶剂中的紫外-可见光谱研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2007, **27**(2): 325—328.
- [5] 张金平,杨胜科,段磊等. 苏丹红系列染料在有机溶液中的紫外-可见光谱研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2007, **27**(5): 982—985.
- [6] Grampp G, Muresanu C, Landgraf S. Solvent Influence on the Electrochemical Reduction of Photochemically Generated Cis-Azobenzene[J]. *J. Electroanal. Chem.*, 2005, **582**(1—2): 171—178.
- [7] Abraham M H, Amin M, Zissimos A M. The Lipophilicity of Sudan I and Its Tautomeric Form[J]. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2002, **4**(23): 5748—5752.
- [8] 詹豪强,田禾. 萘酚偶氮染料光化学氧化及其降解机理研究进展[J]. 染料工业, 1997, **34**(2): 7—12, 25.
- [9] Tang B, Wang X, Wang G L *et al.* Highly Sensitive and Selective Spectrofluorimetric Determination of Tolnaftate Through the Formation of Ternary Inclusion Complex of Naphthol/Cyclodextrin/Anionic Surfactant System[J]. *Talanta*, 2006, **69**(1): 113—120.

Ultraviolet-Visible Spectrum of Sudan I in Ethanol Solution

CAO Wen-Gen ZHAI Ke-Feng ZHOU Fang

(College of Chemistry and Life Science, Suzhou University, Suzhou, Anhui 234000, P. R. China)

Abstract Ultraviolet-visible spectrum of Sudan I in polar ethanol solution as well as the influence of water, acid, base, temperature and time on it were discussed. The results showed that the ultraviolet-visible characteristic absorption peaks of Sudan I in ethanol solution were mostly concerned with its azo-hydrazone and molecular form. In ethanol-water solution, the maximum bathochromic shift of visible characteristic absorption peak for Sudan I was 11nm and the maximum absorbance strength of Sudan I increased 30.6%. The important reason for these was that the destroyed intramolecular hydrogen bond enlarged the scope of the π delocalized bond. The change of the ultraviolet-visible characteristic absorption peak in acidic/basic-ethanol solution resulted mainly from the tautomerism of its molecular and ion form. No affection in the Ultraviolet-Visible characteristic absorbance intensity was observed although the temperature(10—40℃) or time were changed, which was mostly relative to cis-conformation of Sudan I.

Key words Sudan I; Ethanol; Ethanol-Water; Acid; Base; UV-Vis Spectrum