^{17}O -NMR与拉曼光谱法研究 CuCl_2 和 CuSO_4 对水结构的影响*

阎 波 赵 林** 王 文 华 谭 欣

(天津大学环境科学与工程学院, 天津, 300072)

摘 要 利用 ^{17}O -NMR 化学位移、半峰宽和核磁共振系数 (B) 与水团簇结构和水分子缔合的关系, 分析了 CuCl_2 和 CuSO_4 对水结构的影响. 同时比较了纯水和不同浓度 CuCl_2 和 CuSO_4 溶液的羟基伸缩振动拉曼光谱. 研究表明, CuCl_2 和 CuSO_4 均具有促进水分子缔合, 使水团簇加大的作用, 且 CuSO_4 对水的缔合作用大于 CuCl_2 . Cl^- 对水缔合的破坏作用大于 SO_4^{2-} . Cu^{2+} 作为顺磁离子, 在核磁共振弛豫过程中, 对缩短水中质子的自旋-晶格弛豫时间, 使谱线变宽作用明显. 拉曼光谱主要反映阴离子对水结构的影响, 而 ^{17}O -NMR 方法能够全面反映阴、阳离子和化合物对水缔合程度的影响.

关键词 CuCl_2 , CuSO_4 , ^{17}O -核磁共振, 拉曼光谱, 水结构.

核磁共振法和拉曼光谱法是目前研究水结构的重要手段, 其中核磁共振法可以定性地表征离子、无机物和有机物对水缔合程度的影响, 甚至可以作出相对定量化的表征. 拉曼光谱法则是通过了解水中羟基的变化, 从而间接给出水结构变化的信息.

本文利用核磁共振法研究 CuCl_2 和 CuSO_4 对 ^{17}O -NMR 化学位移、半峰宽和自旋-晶格弛豫时间 (T_1) 的影响, 并用拉曼光谱法比较纯水和不同浓度 CuCl_2 、 CuSO_4 溶液的羟基伸缩振动拉曼光谱的异同, 从微观结构上认识水中常见重金属离子 Cu^{2+} 和常见阴离子 Cl^- 、 SO_4^{2-} 对水结构的影响.

1 分析方法

分别将 CuCl_2 和 CuSO_4 (分析纯) 配成 $0\text{--}50\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ 范围内不同浓度的溶液进行实验, 实验用水为三蒸水, 实验温度 298K . 使用 Bruker Av-400 型核磁共振波谱仪, 测试水 (电导率为 $1.2\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$) 和 CuCl_2 、 CuSO_4 溶液中自然丰度的 ^{17}O 同位素, 共振频率为 54.243MHz . 用封闭于毛细管中的重水锁磁场, 并以它为外标, 以同温度下重水的 ^{17}O -NMR 峰的位置为坐标原点 (向左为正), 测定化学位移, 设定分辨率 1.06Hz , 采集时间 0.16s , 重复延迟 0.3s , 测量次数 1536 次.

T_1 值采用 $180^\circ\text{--}\tau\text{--}90^\circ$ 脉冲程序测定, 90° 脉冲宽度为 $13.95\mu\text{s}$, 脉冲延迟时间 τ 值分别取 0.01 , 0.05 , 0.1 , 0.3 , 0.6 , 1 , 2 , 4 , 6 , 8 , 11 , 15 , 20 和 100ms . T_1 值由仪器自带的拟合程序, 按照信号强度的指数关系式:

$$S\tau = S_0 (1 - e^{-\tau/T_1}) \quad (1)$$

采用最小二乘法拟合得到, 误差约为 $\pm 5\%$.

拉曼光谱实验采用 Bruker RFS100/S 型拉曼光谱仪, 采用 Nd:YAG 激光器, 激光波长为 1064nm , 激光功率为 400mW , 光谱测试范围 $2500\text{--}4000\text{cm}^{-1}$, 分辨率为 2cm^{-1} .

2 CuCl_2 和 CuSO_4 对 ^{17}O -NMR 化学位移的影响

由图 1(a) 可见, 在测定的浓度范围内, 随着水中 CuCl_2 和 CuSO_4 浓度的增加, 水的 ^{17}O -NMR 化学位移均增加, 而且水的 ^{17}O -NMR 化学位移与溶液浓度的变化关系为线性关系, 关系式分别为:

$$\begin{aligned} \delta(^{17}\text{OH}_2)_{\text{CuCl}_2} &= 3.1817 + 0.86C & R^2 &= 0.9977 \\ \delta(^{17}\text{OH}_2)_{\text{CuSO}_4} &= 3.2086 + 0.8712C & R^2 &= 0.9983 \end{aligned}$$

2008 年 5 月 26 日收稿.

* 国家自然科学基金资助项目 (20776096). ** 通讯作者, zhaoliu@tju.edu.cn

理论研究认为, 水分子的缔合程度受温度、离子的影响是相似的^[1]. 随着温度的升高, 水分子的热运动加剧, 使水分子之间的氢键减弱, 每个水分子平均所含的氢键数相应减少, 从而使水的缔合程度下降^[2]. 在 ^{17}O -NMR 的化学位移和半峰宽上, 表现为随着温度的升高, ^{17}O -NMR 的化学位移和半峰宽持续降低^[3], 由此可推知, ^{17}O -NMR 化学位移减小, 表明水的缔合程度降低, 水分子团簇相应变小; 同样, ^{17}O -NMR 半峰宽变窄表明水分子的活动性增加, 缔合程度降低, 水团簇变小. 水中离子对水结构的影响与温度对水结构的影响相似, 能够使水的 ^{17}O -NMR 化学位移和半峰宽增加的离子即为促进水分子缔合, 使水分子簇增大的离子, 相反则为破坏水分子缔合, 使水分子簇减小的离子. 由此可以推断, CuCl_2 和 CuSO_4 均具有促进水分子缔合, 使水团簇加大的作用.

同时, 由上述两关系式的斜率可以看出, CuSO_4 对水的缔合作用大于 CuCl_2 . 由于阳离子对水缔合有促进作用, 阴离子对水缔合有破坏作用^[4], 而离子对水结构的破坏是特定的^[5], 此两种盐的阳离子都是 Cu^{2+} , 因此, 可以推断 Cl^- 对水缔合的破坏作用大于 SO_4^{2-} .

3 CuCl_2 和 CuSO_4 对 ^{17}O -NMR 半峰宽的影响

由图 1(b) 可见, 在测定的浓度范围内, 随着水中 CuCl_2 和 CuSO_4 浓度的增加, 水的 ^{17}O -NMR 半峰宽均变宽, 在溶液浓度小于 $1\text{mmol}\cdot\text{l}^{-1}$ 时, 水的 ^{17}O -NMR 半峰宽变化有较大波动, 浓度大于 $1\text{mmol}\cdot\text{l}^{-1}$ 后, 与溶液浓度的变化关系呈线性关系. 由此可以推断, CuCl_2 和 CuSO_4 均具有促进水分子缔合, 使水团簇加大的作用.

图 1 CuCl_2 和 CuSO_4 对水 ^{17}O -NMR 化学位移和半峰宽的影响

Fig 1 Effect of CuCl_2 and CuSO_4 on water ^{17}O -NMR chemical shifts and half-height widths of peaks

4 CuCl_2 和 CuSO_4 对 ^{17}O -NMR 自旋-晶格弛豫时间 (T_1) 和核磁共振系数 (B) 的影响

核磁共振系数 (B) 定义如下^[6]:

$$T_1^0/T_1 = 1 + BC + DC^2 + \dots \quad (2)$$

式中, T_1^0 为三蒸水的 ^{17}O -NMR 自旋-晶格弛豫时间, T_1 为不同浓度下 CuCl_2 和 CuSO_4 溶液中水的 ^{17}O -NMR 自旋-晶格弛豫时间, C 为溶液浓度. 在浓度较低范围 ($C < 0.1\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$) 时, D 值可以忽略不计.

按照脉冲延迟时间 τ 值最小略长于仪器设定的死时间, 最大大于 $5T_1$ 的设定原则^[7], 取 14 个不同的 τ 值, 以反转回法, 根据式 (1), 由仪器自带的拟合程序采用最小二乘法进行拟合, 分别测定三蒸水和 CuCl_2 , CuSO_4 溶液中水的 ^{17}O -NMR 自旋-晶格弛豫时间值 (见表 1), 得到的 T_1^0/T_1 与溶液浓度的关系如图 2 所示. 在测定的浓度范围内, 随着水中 CuCl_2 和 CuSO_4 浓度的增加, T_1^0/T_1 线性增加, 关系式分别为:

$$T_1^0/T_{1\text{CuCl}_2} = 0.9988 + 0.0238C \quad R^2 = 0.9892$$

$$T_1^0/T_{1\text{CuSO}_4} = 1.0009 + 0.0468C \quad R^2 = 0.9981$$

对照式 (2), 可推知 $B_{\text{CuCl}_2} = 0.0238$, $B_{\text{CuSO}_4} = 0.0468$. 由于 CuCl_2 和 CuSO_4 的 B 值均为正值, 可以判断, CuCl_2 和 CuSO_4 均具有促进水分子缔合, 使水团簇加大的作用^[6]. 且 $B_{\text{CuSO}_4} > B_{\text{CuCl}_2}$, CuSO_4 对水的缔合作用大于 CuCl_2 , 与水的 ^{17}O -NMR 化学位移测定结果一致.

表 1 纯水和 CuCl_2 、 CuSO_4 溶液中水的 ^{17}O -NMR 自旋-晶格弛豫时间 T_1 (ms)Table 1 ^{17}O -NMR spin-lattice relaxation times of pure water and water in CuCl_2 、 CuSO_4 solutions

浓度 / $\text{mmol} \cdot \text{l}^{-1}$	0	0.1	0.3	0.5	0.7	1.0	2.0
CuCl_2	7.310	7.278	7.267	7.244	7.234	7.149	6.973
CuSO_4	7.310	7.259	7.209	7.138	7.049	6.995	6.675

图 2 CuCl_2 和 CuSO_4 溶液 T_1^0/T_1 与溶液浓度的关系Fig 2 Concentration dependence on T_1^0/T_1 of CuCl_2 and CuSO_4

5 Cu^{2+} 的顺磁效应对弛豫过程的影响

因为 Cu^{2+} 的外层电子层结构具有未成对电子, 因此, 是一种常见的顺磁离子, 由于顺磁离子在核磁共振弛豫过程中, 与相邻水分子质子之间发生自旋交换作用^[8], 从而缩短了水中质子的自旋-晶格弛豫时间, 并使谱线变宽. 当 CuCl_2 和 CuSO_4 的溶液浓度超过 $4\text{mmol} \cdot \text{l}^{-1}$ 时, 因谱线信噪比较高, ^{17}O -NMR 的化学位移便捕捉不到, 浓度超过 $3\text{mmol} \cdot \text{l}^{-1}$ 时, ^{17}O -NMR 的半峰宽便无法测定, 而对 ^{17}O -NMR 自旋-晶格弛豫时间则影响更大, 因此, 核磁共振实验只能在较低浓度范围进行.

6 CuCl_2 和 CuSO_4 溶液的拉曼光谱

图 3(a) 和 (b) 分别是三蒸水和 CuCl_2 、 CuSO_4 溶液的羟基伸缩振动拉曼光谱, 为了使离子的影响明显, 使用的溶液浓度高于核磁共振实验的溶液浓度, 同时为了便于比较, 所有的拉曼峰都转化为同样的高度. 对图中各峰进行指认, $3242\text{--}3300\text{cm}^{-1}$ 为带氢键的 O—H 伸缩振动峰, $3372\text{--}3405\text{cm}^{-1}$ 为不带氢键的 O—H 伸缩振动峰^[9], 其中 3300cm^{-1} 左右的强肩峰是水结构的代表性指数, 峰强度愈大, 代表水的结构化程度愈大^[10]. 由图 3(a) 和 (b) 可看出, CuCl_2 和 CuSO_4 的加入, 均对水中带氢键的结构产生了很大的影响, 随着溶液浓度的增加, 强肩峰峰强度降低, 表明水结构化程度降低.

由图 3(c) 可见, 对于相同浓度的 CuCl_2 和 CuSO_4 ($50\text{mmol} \cdot \text{l}^{-1}$), CuSO_4 溶液在 3300cm^{-1} 左右的强肩峰峰强度大于 CuCl_2 , 表明 CuCl_2 对水的氢键结构影响较大, CuCl_2 对水结构化程度的降低作用大于 CuSO_4 , 进而推断 Cl^- 对水结构的破坏作用大于 SO_4^{2-} .

将拉曼光谱实验结果与 ^{17}O -NMR 结果比较, 都可得到 Cl^- 对水结构的破坏作用大于 SO_4^{2-} 的一致结论, 但 ^{17}O -NMR 的实验结果推断 CuCl_2 和 CuSO_4 均具有促进水分子缔合的作用, 拉曼光谱则显示 CuCl_2 和 CuSO_4 的加入使水的结构化程度降低, 两种结论看似存在差异. 事实上, 以往对不同阳离子体系水分子的拉曼光谱研究表明, 阳离子对水分子的拉曼光谱影响很小^[11], 在纯水中加入电解质后, 水分子立即与离子发生溶剂化作用, 水分子的氢端与阴离子作用, 而氧端与阳离子作用. 与阴离子作用的氢原子不可能再与其它水分子保持氢键作用, 使得水分子间氢键被完全破坏^[12], CuCl_2 和 CuSO_4 溶液的拉曼光谱表现的正是这种作用, 因此, 用拉曼光谱研究 CuCl_2 和 CuSO_4 对水分子结构的影响, 主要反映的是阴离子对水结构的破坏作用, 而阳离子 Cu^{2+} 对水分子的拉曼光谱影响很小, 反映在整体上则表现为 CuCl_2 和 CuSO_4 的加入使水的结构化程度降低. 事实上阳离子对水分子结构的促进作用是不可忽视的, 用 ^{17}O -NMR 法研究 CuCl_2 和 CuSO_4 对水分子结构的作用, 则综合考虑了阴、阳离子的

分别作用和共同作用, Cu^{2+} 对水分子缔合有促进作用, 而 Cl^- 和 SO_4^{2-} 则对水分子缔合有破坏作用, Cu^{2+} 的促进作用大于 Cl^- 和 SO_4^{2-} 的破坏作用, 因此, 综合表现为 CuCl_2 和 CuSO_4 均具有促进水分子缔合的作用. 由此可见, 拉曼光谱与 ^{17}O -NMR 的实验结果并不矛盾, 拉曼光谱着重反映了阴离子的破坏作用, 而 ^{17}O -NMR 方法则更能全面地反映阴、阳离子和化合物对水缔合程度的影响, 甚至可以作出相对量化的表征.

图 3 不同浓度的 CuCl_2 , CuSO_4 溶液和纯水拉曼光谱的比较

(a) CuCl_2 , (b) CuSO_4 , (c) CuCl_2 , CuSO_4 和纯水

Fig. 3 Comparison of Raman spectra of CuCl_2 , CuSO_4 solutions and water

综上所述, 根据水的 ^{17}O -NMR 化学位移、半峰宽和自旋-晶格弛豫时间比率 (T_2^0/T_1) 随 CuCl_2 和 CuSO_4 浓度的增加而增加的趋势, 可以推断 CuCl_2 和 CuSO_4 均具有促进水分子缔合, 使水团簇加大的作用. 且根据水的 ^{17}O -NMR 化学位移与 CuCl_2 , CuSO_4 浓度的线性关系斜率以及核磁共振系数 B 的大小可以推断 CuSO_4 对水的缔合作用大于 CuCl_2 , Cl^- 对水缔合的破坏作用大于 SO_4^{2-} .

Cu^{2+} 作为顺磁离子, 在核磁共振弛豫过程中, 与相邻水分子质子之间发生自旋交换作用, 从而缩短了水中质子的自旋-晶格弛豫时间, 并使谱线变宽. 因此, CuCl_2 和 CuSO_4 对水的 ^{17}O -NMR 化学位移、半峰宽和自旋-晶格弛豫时间 (T_1) 的影响测定只能在浓度小于 $4\text{mmol}\cdot\text{l}^{-1}$ 的范围内进行测定.

另外, 根据纯水和 CuCl_2 , CuSO_4 溶液拉曼光谱 3300cm^{-1} 左右的强肩峰峰强度的变化, 可以推断 Cl^- 对水缔合的破坏作用大于 SO_4^{2-} , 与 ^{17}O -NMR 的结果一致, 拉曼光谱主要反映阴离子对水结构的影响, 而 ^{17}O -NMR 方法能够全面反映阴、阳离子和化合物对水缔合程度的影响.

参 考 文 献

- [1] Leberm R, Soper A K. Effect of High Salt Concentrations on Water Structure [J]. *Nature*, 1995, **378**: 364–366
- [2] George A Jeffrey. An Introduction to Hydrogen Bonding [M]. New York: Oxford University Press, 1997, 135–152
- [3] 李睿华, 蒋展鹏, 师绍琪等. ^{17}O -NMR 研究 Al(III), Fe(III) 盐对水缔合的影响 [J]. *环境化学*, 2003, **22** (2): 189–192
- [4] Ruihua L, Zhanpeng J, Hongwei Y et al. Effects of Ions in Natural Water on the ^{17}O NMR Chemical Shift of Water and Their Relationship to Water Cluster [J]. *Journal of Molecular Liquids*, 2006, **126**: 14–18
- [5] Vahur M aenets, Ilmar Koppel. Effects of Ions on the ^{17}O and ^1H Chemical Shifts of Water [J]. *J. Chem. Soc., Faraday Trans.*, 1998, **94**: 3261–3269
- [6] Engel G, Hertz H G. On the Negative Hydration. A Nuclear Magnetic Relaxation Study [J]. *Ber. Bunsen-Ges. Phys. Chem.*, 1968, **72**: 808–834
- [7] 毛希安. 现代核磁共振实用技术及应用 [M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2000, 79–91
- [8] Bloembergen N. Proton Relaxation Times in Paramagnetic Solutions [J]. *The Journal of Chemical Physics*, 1957, **27** (2): 572–573
- [9] 郁鉴源, 周群. 水和重水的拉曼光谱研究 [J]. *光散射学报*, 1994, **6** (2): 81–85
- [10] Nikolov Z S, Goutev N, Matsuura H. Hydrogen Bonding in Concentrated Aqueous Solutions of 1,2-Dimethoxyethane. Formation of Water Clusters [J]. *Journal of Physical Chemistry A*, 2001, **105** (48): 10884–10889
- [11] Walrafen G E. Raman Spectral Studies of the Effects of Solutes and Pressure on Water Structure [J]. *The Journal of Chemical Physics*, 1971, **55** (2): 768
- [12] 邹爱忠, 陈燕霞, 田中群等. 不同电解质体系水的拉曼谱的研究 [J]. *物理化学学报*, 1996, **12** (2): 130–135

THE INFLUENCE OF CuCl_2 , CuSO_4 UPON THE WATER STRUCTURE WITH ^{17}O -NMR AND RAMAN SPECTRA

YAN Bo ZHAO Lin WANG Wen-hua TAN Xin

(School of Environment Science and Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

ABSTRACT

The influences of CuCl_2 and CuSO_4 upon the water structure were studied with ^{17}O -NMR and Raman spectra. The effects of CuCl_2 and CuSO_4 on ^{17}O -NMR chemical shift, half-height widths of peaks and spin-lattice relaxation times (T_1) of water were tested at low concentrations. With the relationship between ^{17}O -NMR chemical shift, half-height widths of peaks, NMR $B\rho$ -coefficients and water cluster structure, water association, the effect of CuCl_2 and CuSO_4 on water structure were analyzed. Raman spectra in the OH stretch region of water and various concentrations of CuCl_2 and CuSO_4 were compared. It was proved that they all increased water association and the size of water clusters; the effect of CuSO_4 on promotion water association was stronger than that of CuCl_2 , at the same time, the effect of Cl on break water association was stronger than that of SO_4^{2-} . As paramagnetic ion, Cu^{2+} had obvious effect on shorten protons spin-lattice relaxation times in water and broaden the line width of NMR spectroscopy during NMR relaxation process. ^{17}O -NMR could bring more information on the influences of cations, anions and compounds on water structure than Raman spectra, which only indicated the influence of anions.

Keywords CuCl_2 , CuSO_4 , ^{17}O -NMR, Raman spectra, water structure