姜黄素分光光度法测定马林果中 Fe^{3+}

马木提·库尔班 卡马力别克·吾买尔^①

(新疆大学化学化工学院 乌鲁木齐市 830046)

摘要 本文通过分光光度法研究了姜黄素与 Fe^{3+} 的显色反应, 发现其络合物的最大吸收波长为 530nm, 摩尔吸光系数为 $\epsilon_{530} = 1.8 \times 10^5 \text{L/mol} \cdot \text{cm}$ 。校准曲线的回归方程为 $y = 0.0353x + 0.3075$, $r = 0.9898$ 。 Fe^{3+} 含量在 0.4—1.2 $\mu\text{g/mL}$ 范围内有很好的线性关系。在 $\text{pH} = 11.8$ 介质中姜黄素与 Fe^{3+} 形成 1:1 的络合物, 并且其稳定, 方法的选择性好, 用于各种水果中铁的测定, 可得到满意的结果。

关键词 姜黄素, Fe^{3+} , 分光光度法, 二元络合物。

中图分类号: O657.32

文献标识码: B

文章编号: 1004-8138(2007)03-0363-03

1 前言

姜黄素易溶于乙醇, 酸或醚中, 遇碱变红中和后复原^[1]。姜黄素(Curcumin)是由薑荷科(Zingiberaceae)植物中提取的一种天然色素。姜黄素有植物提取品和人工合成两种。姜黄素溶液的 pH 在 7.8 时为黄色, pH 在 9.2 时为红棕色^[2]。近几年来姜黄素在药理方面使用的较多, 但它作为显色剂应用较少。据文献报道: 姜黄素 20 世纪 50 年代曾用于微量硼的测定^[3]。在 20 世纪 90 年代又有姜黄素光度法测定岩矿石中铍^[4]的报道, 但有关姜黄素与铁形成二元络合物却未见报道。

本文根据姜黄素共轭体系中可以离解的官能团, 有可能与金属离子作用的性质, 研究了姜黄素与 Fe^{3+} 的反应。发现在碱性介质中姜黄素与 Fe^{3+} 产生灵敏的显色反应。姜黄素与 Fe^{3+} 形成二元络

合物的吸收波长, 与纯姜黄素的吸收波长比较, 红移了 100nm, 姜黄素与 Fe^{3+} 在 $\text{pH} < 9$ 时不形成络合物, 而 $\text{pH} > 9$ 时形成络合物。而此络合物是在 $\text{pH} 11.2-12.4$ 之间吸光度最大, 并且稳定。 Fe^{3+} 与姜黄素生成 1:1 络合物, 其显色后, 络合物至少稳定 60min, λ_{max} 为 530nm, 摩尔吸光系数达 $1.8 \times 10^5 \text{L/mol} \cdot \text{cm}$, 干扰少, 选择性好。这种方法用于测定在马林果中微量的 Fe^{3+} 时可得到满意的结果。

① 联系人, 电话: (0991) 8580121(宅); 手机: (0) 13565919556; E-mail: mumut2006@163.com

作者简介: 马木提·库尔班(1950—), 男, 维吾尔族, 研究方向为三元络合物及其应用, 天然植物有效成分分析。

收稿日期: 2006-12-27; 接受日期: 2007-02-07

2 实验部分

2.1 实验仪器

722 型分光光度计(上海精密科学仪器有限公司), 320 型酸度计[梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司]。

2.2 实验试剂与材料

姜黄素溶液的配制: 取 0.40g 姜黄素和 50g 草酸溶解于乙醇中, 转移到 1000mL 容量瓶中, 稀释至刻度, 室温下放置一周后可使用。

Fe^{3+} 标准溶液的配制: 取 0.8634g $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 置于 200mL 烧杯中, 加入 20mL 6mol/L HCl 溶液和少量水, 溶解后转移到 1L 容量瓶, 用水稀释至刻度, 摇匀。此溶液的浓度为 $100\mu\text{g}/\text{mL}$, 使用时用水稀释为 $5\mu\text{g}/\text{mL}$ 。

缓冲溶液: 取 0.1mol/L Na_2HPO_4 溶液 500mL 至 1L 容量瓶中, 再加入 4% NaOH 溶液 330mL, 用蒸馏水稀释至刻度线, 在酸度计上调正 pH 为 11.8。实验用水为蒸馏水。

2.3 供试样的处理

取 5g 马林果试样放入坩埚中, 加热至灰化, 加(1+1) HNO_3 溶液溶解样品, 过滤。加入 30% 的过氧化氢溶液数滴, 脱色, 转移于 100mL 容量瓶及稀释至刻度, 备用。

3 结果与讨论

3.1 最大吸收波长的选择

分别吸取 3mL 姜黄素标准溶液置于 25mL 容量瓶中用水稀释至刻度, 在 350—520nm 之间进行扫描, 实验结果表明, 姜黄素在 430nm 处有最大吸收, 而在实验条件下, 姜黄素与 Fe^{3+} 在缓冲溶液存在下, 波长在 470—620nm 处进行扫描, 实验结果表明, 在 530nm 波长时有最大吸收, 因此本文选用 530nm 作为测定波长。

3.2 校准曲线的绘制

分别吸取 $5\mu\text{g}/\text{mL}$ 的铁标准溶液 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0mL 于 25mL 容量瓶中, 各加入 0.5mL 姜黄素溶液再加 pH 为 11.8 的缓冲溶液 1mL, 用水稀释至刻度。实验结果表明, Fe^{3+} 含量在 0.4—1.2 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 范围内有很好的线性关系。回归方程为: $y = -0.0353 + 0.3075x$, $r = 0.990$, 摩尔吸光系数 $\epsilon = 1.8 \times 10^5 \text{L}/\text{mol} \cdot \text{cm}$ 。

3.3 显色酸度

当溶液介质在 $\text{pH} < 9$ 时, 显色反应不能进行。在 Na_2HPO_4 -NaOH 缓冲溶液中, pH 为 11.2—12.4 范围内吸光度最大并较稳定。本实验选用 pH 为 11.8 条件。

3.4 姜黄素用量

姜黄素用量对络合物吸光度的影响较大, 须严格控制, 实验结果表明, 姜黄素溶液用量 0.2—0.8mL 范围内络合物吸光度大且稳定, 因此, 本实验选用 0.5mL。

3.5 缓冲溶液的用量

缓冲溶液的用量对络合物的吸光度影响较大。因此严格控制本实验结果表明, 缓冲溶液用量在 0.5—2.0mL 范围内吸光度较大, 且稳定。因此本实验选用 1mL 缓冲溶液。

图 1 姜黄素- Fe^{3+} 和纯姜黄素的吸收光谱
1——姜黄素/水空白; 2——二元络合物/试剂空白。

3.6 络合物组成

本实验采用连续变化法(等摩尔系列法)和摩尔比法测定配合物的组成。实验结果表明姜黄素与铁形成 1:1 的络合物。

3.7 时间对络合物稳定性的影响

在测定过程中发现,将络合物显色后放置 60min 以内,体系的吸光度较稳定,60min 后溶液的吸光度值逐渐减少。所以,这种络合物显色后应在 40min 内测完。

3.8 样品分析

取适量的马林果样品溶液于 25mL 容量瓶中,加姜黄素溶液 0.5mL;再加 1mL pH 为 11.8 的缓冲溶液,用水稀释至刻度,试剂为空白,于 530nm 波长下,测定吸光度值,由校准曲线查得 Fe^{3+} 含量为 $3\mu\text{g}/\text{mL}$ 。

3.9 共存离子的影响

测定 $2\mu\text{g}/25\text{mL}$ 允许共存物质量(μg)如下: Pb^{2+} (0.27), Ni^{2+} (1.46), Sr^{2+} (0.79), Al^{3+} (1.41), Co^{2+} (1.24), Zn^{2+} (3.39), NH_4^+ (1.08), Na^+ (1.22), Mg^{2+} (1.24), Cu^{2+} (1.28), Fe^{3+} (0.25), Cr^{3+} (0.63) 对测定有干扰。

3.10 讨论

(1) 配制姜黄素溶液时,加入草酸,能提高 Fe^{3+} 与姜黄素反应的灵敏度,所以很多情况下,加入适量的草酸来配制姜黄素溶液。

(2) 姜黄素有植物提取物和人工合成两种,据文献报道人工合成不与 Fe^{3+} 发生显色反应。

(3) 如果溶液的 pH> 9 时 姜黄素与 Fe^{3+} 形成的二元络合物的稳定性较好,仅能在 40—60min 中测定,得到较好的结果。

参考文献

- [1] 天津轻工业学院和无锡轻工业学院合编. 食品生物化学[M]. 北京: 轻工业出版社, 1988. 428.
- [2] 宋思烈, 刘振等译(日). 实用无机光度分析[M]. 沈阳: 辽宁人民出版社, 1983. 5.
- [3] 胡之德, 赵正风. 分光光度分析[M]. 银川: 宁夏人民出版社, 1981. 600.
- [4] 裴世桥. 姜黄素分光光度法直接测定岩矿中铍[J]. 分析化学. 1992, 20(1): 97.

Spectrophotometric Determination of Fe^{3+} in *Rubus Chingu Hu*

MAMUTI Kurban KAMALIBIEKE Wumaier

(College of Chemistry & Chemical Engineering, Xinjiang University, Urumqi 830046, P. R. China)

Abstract Fe^{3+} in *Rubus chingu hu* was determined by spectrophotometry. The result indicated that the maximum absorbing wavelength of the complex was 530nm and the molar absorption coefficients was $\epsilon_{530} = 1.8 \times 10^5 \text{L}/\text{mol} \cdot \text{cm}$. Regression equation of the standard curve is $y = 0.0353 + 0.3075x$, $r = 0.9898$. Beer's law is well obeyed in the range of 0.4—1.2 $\mu\text{g}/\text{mL}$. In pH = 11.8 medium, a stable complex with curcumin and Fe^{3+} ratio of 1:1 was formed the method has good selectivity, and it can be applied to the determination of Fe^{3+} in different fruits.