川贝母新资源太白贝母中生物碱类成分含量测定

段宝忠¹, 王丽芝¹, 黄林芳^{1*}, 魏大华², 卢其福² (1. 中国医学科学院北京协和医学院药用植物研究所, 北京 100193; 2. 广州潘高寿药业股份有限公司, 广州 511490)

摘要:目的 利用高效液相色谱法测定太白贝母中的生物碱成分。方法 采用 Agilent Extend C₁₈柱 (4.6 mm × 250 mm, 5 μm), 流动相为甲醇-0.02% 三乙胺水溶液, 梯度洗脱, 流速为 1.0 mL·min⁻¹, 漂移管温度 90 °C; 载气体积流量 2.3 L·min⁻¹, 增益值 2 进样量 10 μL; 柱温 25 °C。结果 贝母辛在 28.75~690.0 μg·mL⁻¹, 贝母素乙在 27.37~560.6 μg·mL⁻¹, 贝母素甲在 25.75~527.0 μg·mL⁻¹与峰面积的对数值呈线性关系, 平均回收率分别为 99.4% (n=6), RSD 为 1.10%; 99.7% (n=6), RSD 为 3.61%; 100.3% (n=6), RSD 为 2.82%。结论 太白贝母中的生物碱成分与川贝母非常相似, 为其作为川贝母来源的合理性奠定了基础。

关键词: 太白贝母; 生物碱; 高效液相色谱-蒸发光检测法

中图分类号: R917 文献标志码: A 文章编号: 1001-2494(2011)05-0382-03

Determination of Main Alkaloids in *Fritillaria taipaiensis* by HPLC-ELSD

DUAN Bao-zhong¹, WANG Li-zhi¹, HUANG Lin-fang^{1*}, WEI Da-hua², LU Qi-fu² (1. Institute of Medicinal Plant Development, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Beijing 100193, China; 2. Guangzhou Pangaoshou Pharmaceutical Co., Ltd, Guangzhou 511490, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To develop a HPLC method for determining the contents of peimisine, imperiline and peimine in *Fritillaria taipaiensis*. **METHODS** The analyses were performed on an Agilent Extend C₁₈ column (4.6 mm × 250 mm, 5 μm). The investigated compounds were separated with gradient mobile phase consisting of methanol-water-triethylamine at the flow of 1.0 mL·min⁻¹. The temperature for the detector drift tube was set at 90 °C and the nitrogen flow-rate was 2.3 L·min⁻¹, the gain in ELSD was set at 2 in order to obtain the best sensitivity, and the injection volume was 10 μL. **RESULTS** The investigated compounds including peimisine, peimine and imperiline had good linearity ($r^2 \geq 0.9991$) within the tested ranges. The average recoveries were 99.4%, 99.7% and 100.3% with RSD ≤ 3.61%. **CONCLUSION** The developed method can be applied to control the quality of the *F. taipaiensis* with a good accuracy, sensitivity and repeatability.

KEY WORDS *Fritillaria taipaiensis*; alkaloids; HPLC-ELSD

太白贝母为百合科 (Liliaceae) 贝母属 (*Fritillaria*) 植物 *Fritillaria taipaiensis* P. Y. L 的干燥鳞茎, 具清热润肺、止咳化痰之功效, 为 2010 年版《中国药典》(一部) 新增的川贝母药材基原植物。太白贝母适应性强, 栽培技术成熟, 是川贝母中适宜家种栽培的最佳品种^[1]。据研究报道, 生物碱是贝母的主要活性成分^[2], 目前有关太白贝母的生物碱含量尚未见相关研究, 为探讨其与川贝母化学成分的相关性, 本实验建立了 HPLC-ELSD 法同时测定太白贝母中 3 种生物碱的方法, 并对重庆地区的 5 个批次的太白贝母含量进行了分析, 取得了较满意的结果, 为太白贝母的质量控制提供了科学参考。

1 仪器与试剂

Waters 高效液相色谱仪 (1525 二元泵, 717 型自动进样器, Waters In-line Degasser AF 在线脱气机, 恒温柱箱); Alltech ELSD 2000 蒸发光散射检测器 (Deerfield, USA); 无油空气泵 (天津华生分析仪器厂, WYK-III), Breeze 色谱工作站, 电子分析天平 (Mettler AB135-S)。

贝母素甲 (peimine, 批号 110750-200609)、贝母素乙 (peimisine, 批号 110751-200608)、西贝母碱 (Sipeimine, 批号 110769-200504) 对照品购于中国药品生物制品检定所 (供定量测定用), 贝母辛由本实验室自制, 结构经氢谱、碳谱和质谱鉴定, 纯度经

基金项目: 科技部十一五支撑计划项目 (2006BA D9B05-3); 中医药行业专项基金 (200707007); 中医药行业专项基金 (200807020)

作者简介: 段宝忠, 男, 硕士 研究方向: 中药资源与质量控制 * 通讯作者: 黄林芳, 女, 博士, 副研究员, 硕士生导师 研究方向: 中药资源与质量控制 Tel: (010) 62811448 E-mail: lfhuang@inplad.ac.cn

HPLC峰面积归一化法计算大于98%。甲醇(色谱纯),其他试剂均为分析纯,水为重蒸水。

太白贝母5份样品采于重庆市,经中国医学科学院药用植物研究所陈士林教授鉴定为 *Fritillaria taipaiensis* P. Y. Li。

2 方法与结果

2.1 色谱条件

Agilent Extend C₁₈柱(4.6 mm × 250 mm, 5 μm);流动相为甲醇(A)-0.02%三乙胺(B);流速1.0 mL·min⁻¹;漂移管温度90℃;载气体积流量2.3 L·min⁻¹,增益值2;进样量10 μL;柱温25℃。线性梯度洗脱程序:0~15 min, 35%~55% A, 15~30 min, 55%~72% A, 30~32 min, 72%~75% A, 32~37 min, 75%~80% A, 37~40 min, 80%~85% A, 40~50 min, 85%~90% A。

2.2 对照品溶液的制备

分别精密称取各对照品约2.00 mg,置2 mL量瓶中,加甲醇溶解并稀释至刻度,振摇使混合均匀,配制成混合对照品储备液,备用。

2.3 供试品溶液制备

取药材粉末约2 g(过80目筛),精密称定,置100 mL烧瓶中,加浓氨试液4 mL浸润2 h,精密加入三氯甲烷-甲醇(4:1)的混合溶液60 mL,混匀,置80℃水浴中加热回流3 h,放冷,滤过,滤液挥干,加甲醇定容至2 mL,即得。进液相前用0.45 μm微孔滤膜过滤。

2.4 标准曲线与线性关系考察

取“2.2”对照品储备液,采用逐级稀释法分别制取贝母辛为28.75、57.5、115.0、230.0、690.0 μg·mL⁻¹,贝母素乙27.37、54.75、109.5、219.0、560.6 μg·mL⁻¹和贝母素甲25.75、51.50、103.0、206.0、527.0 μg·mL⁻¹的对照品标准液。按“2.1”色谱条件进行HPLC-ELSD分析,用外标法以对照品的峰面积(y)与相对应的浓度(ρ)做双对数线性回归处理,回归方程见表1。

2.5 精密度实验

取3个不同浓度的对照品混合溶液,每个浓度重复进样3次,每次10 μL,测定峰面积,结果表明,各对照品峰面积积分值的RSD分别为贝母辛(0.76%、0.43%、0.69%)、贝母素乙(0.83%、0.77%、0.82%)和贝母素甲(1.81%、1.69%、1.44%)。

2.6 重复性实验

取同一批样品6份,按“2.3”方法制备和“2.1”色谱条件测定,同批样品中贝母辛的平均含量为601.6 μg·g⁻¹,RSD为1.45%,贝母素甲的平均含量为98.6 μg·g⁻¹,RSD为1.91%,贝母素乙的平均含量为58.6 μg·g⁻¹,RSD为1.69%。

2.7 稳定性实验

取“2.3”供试品溶液,分别在0、2、4、8、12、24、36 h进行测定,记录峰面积,贝母辛、贝母素甲、贝母素乙色谱峰的峰面积RSD值分别为1.51%、2.76%、3.69%,表明样品至少在36 h内稳定。

2.8 加样回收率实验

取同一批样品6份,分别精密加入一定量(相当于样品中的量)各生物碱对照品,按供试品溶液的制备方法制备并测定,各贝母辛、贝母素乙、贝母素甲平均回收率分别为99.4%、99.7%和100.3%,RSD值分别为1.10%、3.61%和2.82%。

2.9 样品测定

将采集的样品按照“2.3”方法制备,进样10 μL,平行操作3次,采用外标法计算3个生物碱成分含量,色谱图见图1,测定结果见表2。

3 讨论

3.1 流动相的选择

为了使贝母样品中的各成分分离,比较了甲醇-水和乙腈-水两种流动相系统,结果表明,以甲醇-水流动相为佳,各主要色谱峰分离度好,在60 min内

表1 回归方程与线性范围

Components	Regression equation	r	Calibration range μg·mL ⁻¹
Peimisine	$y = 1.5260x + 3.1336$	0.9991	28.75-690.00
Peiminine	$y = 1.6453x + 2.9451$	0.9993	27.37-560.60
Peimine	$y = 1.6494x + 2.9618$	0.9993	25.75-527.00

图1 生物碱混合对照品溶液(A)和太白贝母样品(B)的HPLC色谱图

Fig. 1 HPLC Chromatogram of reference substance (A) and sample (B)

表 2 太白贝母药材来源及 3 个生物碱成分含量测定结果, $n = 3 \bar{x} \pm s$
 Tab. 2 The contents of three alkaloids in *Fritillaria taipaiensis*. $n = 3 \bar{x} \pm s$

Collection site	Collection time	Product type	Content/%		
			Peimisine	Peim inine	Peim ine
Wuxi county (wild)	2008-5-3	Qingbei	0.00050±0.003	0.00007±0.006	0.00006±0.001
Wuxi county (wild)	2008-5-3	Songbei	0.00070±0.009	0.00013±0.001	0.00009±0.006
Wuxi county (wild)	2008-5-3	Songbei	0.00060±0.002	0.00010±0.003	0.00006±0.002
Wuxi county (wild)	2008-6-15	Qingbei	0.00030±0.007	0.00007±0.006	0.00004±0.006
Chengkou county (cultivated)	2008-6-15	Qingbei	0.00035±0.002	0.00009±0.005	0.00009±0.007

能达到很好分离, 综合考虑保留时间、分离度及峰形对称性的要求, 我们选择以甲醇-水系统梯度洗脱。另外, 生物碱易发生拖尾现象, 在流动相中加入改性剂 0.02% 三乙胺后, 得到了满意的分离度和较好的峰形。

3.2 ELSD 检测器条件优化

为了使流动相充分挥发和降低灵敏度损失, 选择不分流模式。在此基础上, 考察了漂移管温度和雾化气流速两个最重要参数。按照推荐温度和气流实验, 发现噪音较大, 随着漂移管温度的升高, 检出限降低, 通过实验不同条件, 最后确定最佳条件为漂移管温度 90 °C, 雾化气流速 2.3 L·min⁻¹, 增益值 2。

3.3 提取条件的选择

3.3.1 提取方式的选择 经比较超声提取和回流提取两种方式。结果回流提取效果较好, 因此采用回流提取。

3.3.2 氨水碱化条件的考察 生物碱类化合物提取前应使生物碱类成分充分游离, 浓氨试液的加入量对生物碱提取有显著影响^[3-4]。实验比较了浓氨试液不同用量和不同碱化时间对提取率的影响。最终确定浓氨试液碱化用量为 4 mL, 时间为 2 h。

4 结论

本实验应用 HPLC-ELSD 法, 建立了同时测定 4 种生物碱的方法, 并对太白贝母 3 种生物碱进行了定量测定, 实验结果表明, 太白贝母中贝母辛含量较高, 是总生物碱的主要组成成分, 贝母素甲和贝母素乙含量都较低, 未检测到西贝母碱。这一实验结果与笔者等对川贝母的生物碱成分测定结果基本一

致^[5-7]。从商品规格角度, 松贝中 3 种生物碱的含量明显较青贝高。太白贝母和川贝母中都含有贝母辛, 但贝母素甲和贝母素乙均较低, 二者生物碱成分比较相似。根据对野生和栽培川贝母 (*Fritillaria cirrhosa* D. Don.) 形态特征的观察和分析, 陈心启等^[2, 8]认为太白贝母 (*Fritillaria taipaiensis*) 和川贝母 (*Fritillaria cirrhosa*) 的区别较难把握, 且有过渡, 很可能仅仅是它的一个类型, 其植物形态上较为相似。从化学成分和植物形态角度来看, 2010 年版《中国药典》将太白贝母纳入川贝母项下, 有一定的科学依据。

REFERENCES

- [1] LIU X Q. Cultivation techniques of bulbus *Fritillariae cirrhosae* [J]. *Stockbreeding Market* (畜牧市场), 1992, 6: 455.
- [2] DUAN B Z, CHEN X L, HUANG L F, *et al.* Research progress on resources in bulbus *Fritillariae taipaiensis* [J]. *Modern Chin Med* (中国现代中药), 2010, 12(4): 12-14.
- [3] XIAO P G, JIANG Y, LI P, *et al.* The botanical origin and pharmacogenetic treatment of Chinese materia medica Beimu [J]. *Acta Phytotaxon Sin* (植物分类学报), 2007, 45(4): 473-487.
- [4] JIANG Y, LI P. Determination of verticine and verticinone in bulbus *Fritillariae thunbergii* by HPLC-ELSD [J]. *Chin Pharm J* (中国药学杂志), 2005, 40(16): 1257-1259.
- [5] HUANG L F, CHEN S L, LIU H, *et al.* Determination alkaloids in different processing methods by HPLC-ELSD [J]. *Chin Tradit Pat Med* (中成药), 2009, 31(10): 1560-1564.
- [6] CAO X W. Studies on the chemical constituents from the bulbus *fritillariae cirrhosae* and quality assessment of *Fritillaria* species [D]. Beijing: Peking Union Medical College, 2007.
- [7] YU H, JIANG Y, LI P, *et al.* Study on analytical method for alkaloids in bulbus *Fritillariae cirrhosae* [J]. *China J Chin Mater Med* (中国中药杂志), 2005, 30(8): 572-575.
- [8] CHEN X Q, XIA G C. A taxonomic study of the Chinese drug Beimu (*Fritillaria*) [J]. *Acta Phytotaxon Sin* (植物分类学报), 1977, 15(2): 31-46.

(收稿日期: 2010-09-27)